

Pharmacon exameneisen Adviseren 2 - 2018

Adviseren en informeren over UAD-geneesmiddelen per indicatiegebied

Verkoudheidsklachten

Passend advies geven

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *(allergische) rhinitis (neusslijmvliesontsteking);*
- *bijholteontsteking (sinusitis);*
- *middenoorontsteking;*
- *hooikoorts (pollinose);*
- *verkoudheid, verstopte neus, loopneus;*
- *hoest (droge hoest en productieve hoest)*

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
 - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij verkoudheidsklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik:

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *(allergische) rhinitis (neusslijmvliesontsteking);*
- *bijholteontsteking (sinusitis);*
- *middenoorontsteking;*
- *hooikoorts (pollinose);*
- *verkoudheid, verstopte neus, loopneus;*
- *hoest (droge hoest en productieve hoest)*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o Benoemen wat middelen bij neusslijmvliesontsteking zijn (zie bijlage 1)
 - o Benoemen wat middelen bij pollinose zijn (zie bijlage 1)
 - o Benoemen welke neusdruppels en –sprays en tabletten er zijn (zie bijlage 1)
 - o Benoemen welke inhalatieproducten er zijn (zie bijlage 1)
 - o Benoemen welke middelen er bij verschillende soorten hoest zijn (zie bijlage 1)
 - o Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in UAD-geneesmiddelen bij verkoudheidsklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van UAD-geneesmiddelen (bijlage 1)

Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van een UAD-geneesmiddel

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

Huidklachten

Passend advies geven

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *desinfectie (ontsmetten) van huid en wonden;*
- *koortslijp (herpes labialis, koortsuitslag, koortsblaasjes);*
- *zwemmerseczeem (tinea pedis, voetschimmel);*
- *wratten, likdoorns (eksterogen), steenpuist;*
- *(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken;*
- *luieruitslag;*
- *huiduitslag (eczeem, dauwworm), acne;*
- *hoofdluis*

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

Eindterm 10 a

- o De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
 - Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn
 - virale aandoeningen van de opperhuid
 - bacteriële aandoeningen van de opperhuid
 - schimmelaandoeningen van de opperhuid
 - afwijkingen in de verhoorning van de opperhuid
 - afwijkingen in de talgklierfunctie van de lederhuid
 - de relatie tussen micro-organismen en huidaandoeningen
 - de belangrijkste soorten micro-organismen
 - de invloed van de belangrijkste soorten micro-organismen op de huid

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij huidklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o De basisprincipes van reiniging en ontsmetting van de huid uiteenzetten

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *desinfectie (ontsmetten) van huid en wonden;*
- *koortslip (herpes labialis, koortsuitslag, koortsblaasjes);*
- *schimmelinfectie*
- *zwemmerseczeem (tinea pedis, voetschimmel);*
- *wratten, likdoorns (eksterogen), steenpuist;*
- *(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken;*
- *luieruitslag;*
- *huiduitslag (eczeem, dauwworm), acne;*
- *hoofdluis*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen bij huidklachten (bijlage 1 en 2)
 - o Benoemen wat reiniging- en ontsmettingsmiddelen voor de huid zijn (bijlage 1)
 - o Benoemen welke UAD-geneesmiddelen er zijn bij huidklachten (bijlage 1)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Overige indicaties

(kinderziektes, stoppen met roken, nervositeit, reisziekte, noodanticonceptie, rusteloze benen en vaginale schimmelinfecties)

Passend advies geven

De kandidaat kan voor de overige indicaties waaronder valt:

- *kinderziekten;*
- *nicotinesubstitutie (stoppen met roken);*
- *psychische klachten*
- *reisziekte;*
- *morningafterpil*
- *overgangsklachten*
- *tanden en mond*
- *vaginale schimmelinfecties*
- *urineproblemen*

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
 - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
 - o Omschrijven wat de belangrijkste aspecten van de noodanticonceptiepil zijn

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik

De kandidaat kan voor de overige indicaties waaronder valt:

- *kinderziekten;*
- *nicotinesubstitutie (stoppen met roken);*
- *psychische klachten*
- *reisziekte;*
- *morningafterpil*
- *overgangsklachten*
- *tanden en mond*
- *vaginale schimmelinfecties*
- *urineproblemen*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

Homeopathie

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10c

- De essentie van de homeopathie samenvatten
- De basisprincipes van de homeopathie omschrijven

- o Op hoofdlijnen uitleggen hoe homeopathica werken
- o Omschrijven aan welke eisen de toediening moet voldoen
- o Omschrijven wat een homeopathisch simplex is
- o Omschrijven wat een homeopathisch complex is
- Benoemen welke specifieke risico's kunnen gelden voor homeopathica
- Benoemen welke groep aandoeningen met name geschikt is voor homeopathische behandeling
- Benoemen welke UAD-geneesmiddelen behoren tot de RVH-homeopathische of RVH-fytotherapeutische geneesmiddelen (zie bijlage 1)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Bijlage 1

Producten – 2018

Allergische rhinitis

- Allerfre
- Reactine
- Prevalin
- Allergo-COMOD

Verkoudheid, verstopte neus, loopneus

- Bisolnasal
- Dampo Verkoudheidsbalsem
- Luuf Verkoudheidsbalsem baby
- Luuf Verkoudheidsbalsem kind
- Otrivin
- Otrivin Duo
- Vicks Sinex
- Vicks Vaporub

Droge hoest

- Fluitussin
- Natterman Bronchicum Extra Sterk
- Natterman Noscasan
- Roter Noscapect
- Bisolnex

Productieve hoest

- Mucodyne Adult
- Natterman Bronchicum
- A.Vogel Drosinula
- Bisolhelix

Hoest algemeen

- Bronchostop hoestdrank
- Bronchostop hoestpastilles

Desinfectie

- Betadine Oplossing
- Betadine Scrub
- Betadine Shampoo

- Betadine Zalf
- Betadine Zalfgaas
- Dettol Med Chloorxylenol
- Dettol Med Benzalkoniumchloride
- Dettol Sterilon

Schimmelinfectie

- Canesten Skin
- Daktarin
- Daktarin Nagellak
- Lamisil
- Lamisil Once

Wratten

- Formule W
- Duofilm

(jeuk en pijn bij) Insectenbeten en –steken

- Nestosyl

Huidklachten

- Daro Trekzalf
- Daro Zinkzalf

Hoofdhuidklachten

- Selsun

Hoofdluis

- Loxazol
- Prioderm lotion
- XT Luis

Nicotinesubstitutie

- Nicorette
- Nicotinell
- NiQuitin

Nervositeit

- Valdispert 45 mg
- Valdispert 450 mg

Reisziekte

- Primatour
- Suprimal

Noodanticonceptie

- NorLevo
- EllaOne

Tandcariës

- Corsodyl mondspoeling
- Corsodyl tandgel
- Hextril
- Pyralvex

Urinewegproblemen

- Roter Uva-Ursi
- Granufink Femina
- Granufink Prosta
- Granufink Prosta Forte

Vaginale schimmelinfecties

- Canesten Gyno

Homeopathie

- A. Vogel Alchemilla complex
- A. Vogel Arnica D6
- A. Vogel Avena sativa complex
- A. Vogel Belladonna D4
- A. Vogel Cinuforce
- A. Vogel Famosan
- A. Vogel Nux vomica D4
- A. Vogel Passiflora complex
- A. Vogel Pollinosan
- A. Vogel Thuja D6
- Oscillococcinum
- Traumeel S
- VSM Arnica Montana D6
- VSM Nisyleen
- VSM Okugest
- VSM Tonsiotreen
- VSM Tussistin
- VSM Kind Chamodent
- VSM Kind Cinababy
- VSM Kind Kindigest
- VSM Kind Kindival
- VSM Kind Nisykind tabletten
- VSM Kind Tussikind siroop

Fytotherapie

- A. Vogel Dormeasan
- A. Vogel Drosera complex
- A. Vogel Geriaforce
- A. Vogel Solidago complex
- A. Vogel Thuja ø
- A. Vogel Valeriaan ø = D1
- A. Vogel crème Bioforce

Bijlage 2

Werkzame stoffen – 2018

Allergische rhinitis

- Cetirizinehydrochloride
- Dinatriumcromoglicaat
- Loratadine

Verkoudheid, verstopte neus, loopneus

- Bergdenolie
- Dennennaaldenolie
- Eucalyptusolie
- Ipratropiumbromide
- Kamfer
- Levomenthol
- Majoranaolie
- Oxymetazolinehydrochloride
- Terpentijnolie
- Thymol
- Tramazolinehydrochloride
- Xylometazolinehydrochloride
- Zoutoplossing 0,9% en 2,2%

Droge hoest

- Codeïnefosfaat
- Noscapinehydrochloride

Productieve hoest

- Acetylcysteïne
- Broomhexinehydrochloride
- Carbocisteïne
- Hedera helix
- Dactylopius coccus
- Drosera rotundifolia
- Picea excelsa
- Inula helenium
- Cephaelis ipecacuanha

Hoest algemeen

- Hederae helix extractum
- Althaeae

- Thyme

Acne

- Benzoylperoxide
- Miconazolnitraat

Desinfectie

- Benzalkoniumchloride
- Chloorhexidinedigluconaat
- Chloorxylenol
- Povidon jodium

Koortslip

- Aciclovir
- Penciclovir

Schimmelinfectie

- Clotrimazol
- Miconazolnitraat
- Terbinafinehydrochloride

Wratten

- Melkzuur
- Salicylzuur

(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken

- Pramocaïne
- Tripelennaminehydrochloride
- Zinkoxide

Huidklachten

- Sulfobituminoseammonium
- Zinkoxide

Hoofdhuidklachten

- Seleniumsulfide

Hoofdluis

- Dimeticon
- Malation
- Permetrine

Nicotinesubstitutie

- Nicotine

Nervositeit

- Valeriana extractum

Reisziekte

- Chloorcyclizinehydrochloride
- Cinnarizine
- Meclozinehydrochloride

Homeopathie

- Aconitum napellus
- Alchemilla vulgaris
- Ammi visnaga
- Antimonium sulfuratum auratum
- Arnica montana
- Arsenicum album
- Avena sativa
- Belladonna
- Bryonia alba
- Bryonia cretica
- Calendula officinalis
- Carbo vegetabilis
- Cardiospermum halicacabum
- Chamomilla
- Cimicifuga racemose
- Cinnabaris
- Drosera rotundifolia
- Echinacea angustifolia
- Eucalyptus globulus
- Eupatorium perfoliatum
- Guajacum officinale

Noodanticonceptie

- Levonorgestrel
- Ulipristal acetaat

Tandcariës

- Chloorhexidinedigluconaat
- Hexetidine
- Natriumfluoride
- Rhei extractum
- Salicylzuur

Urinewegproblemen

- Arctostaphylos uvaursi folium (berendruifblad)
- Pompoenpitextract
- Pompoenpitolie

Vaginale schimmelinfecties

- Clotrimazol
- Hepar sulfur
- Hypericum perforatum
- Ignatia amara
- Ipecacuanha
- Kalium bichromicum
- Lachesis mutus
- Luffa operculata
- Melissa officinalis
- Mercurius iodatus ruber
- Nux vomica
- Okoubaka aubrevillei
- Panax ginseng
- Passiflora incarnata
- Phosphorus
- Pulsatilla pratensis
- Sepia officinalis
- Silicea
- Symphytum officinalis
- Thuja occidentalis
- Valeriana officinalis

Fytotherapie

- *Aesculi hippocastani extractum*
- *Arnica montana*
- *Avena sativa*
- *Calendula officinalis*
- *Drosera rotundifolia*
- *Echinacea purpurea*
- *Ginkgo biloba*
- *Hamamelidis extract*
- *Hyperici floris*
- *Ipecacuanha*
- *Melissa officinalis*
- *Passiflora incarnata*
- *Solidago virgaurea*
- *Thuja occidentale*
- *Thymus vulgaris*
- *Valeriana officinalis*
- *Viola tricolor*

Bijlage 3

Terminologie – 2018

Aanbevolen dosering	Bypass
Accidentele overdosering	Candida albicans
Acuut	Cervixkapje
Aderen	Chronische aandoening
Adolescent	Coïtus interruptus
Aften	Combinatiegeneesmiddel
Afweersysteem	Condoom
Allergische reactie	Coördinatieproblemen
Allergische rhinitis	Criteria
Antagonist	
Anticonceptie	Dagdosing
Antidepressiva	Desoriëntatie
Antihistaminica	Diabetici
Antimycotica	Diuretica
Antistollingsmiddelen	Doktersvoorschrift
Antiviraal	Doseringsschema
Anus	Dosis
Ascorbinezuur	Droge hoest
Aspirator	Duizeligheid
Astma	
AV	Eczeem
	Effecten
Baarmoeder	Effectieve dosering
Bacteriële infectie	Eierstokken
Bacteriën	Eksterogen
Beginverergering	Evenwichtsstoornissen
Benauwdheid	Exantheem
Beroerte	Extract
Bewegingsziekte	
Bijwerking	Fenylalanine
Bloedingstijd	Fenylketonurie
Bloedneus	Functiestoornis
Bloedplaatjes	Fytotherapeutica
Bloedstolling	Fytotherapeutisch geneesmiddel
Bloedverdunners	
Braken	Galactosemie
Breed werkingsgebied	Galbulten
Bronchiaal	Gastro oesofageale reflux
Buitenbaarmoederlijke zwangerschap	Geelzucht

Geneesmiddel	Klyisma
Geneeswijze	Koortslip
Geslachtsgemeenschap	Kortademigheid
Geslachtsorganen	Kruidengeneesmiddel
Gestandaardiseerd plantenextract	Kruidentincturen
Giften	
Glaucoom	Lactatie
Gluten	Lactose intolerantie
	Lapp-lactase deficiëntie
H1 antagonist	Lokaal
Haarvat	Longblaasjes
Hallucinatie	Longemfyseem
Hartfalen	Loopneus
Hartritmestoornissen	Luieruitslag
Hemolytische anemie	Luizen
Heparine	
Herpes labialis	Maagsapresistent
Herpes simplex	Maagzweer
Hersenbloeding	MAO-remmers
Histamine	Medisch hulpmiddel
Hoestonderdrukkend	Mee-eter
Hoestprikkel	Megacolon
Homeopathica	Melksuiker
Homeopathisch geneesmiddel	Methotrexaat
Hooikoorts	Micro-organisme
Hormonaal	Miskraam
Huiduitslag	Misselijkheid
Hulpstof	Moedervlek
Hyperaciditeit	Motiliteit
Hypertensie	Mondzweren
Hyperventilatie	Mucolytica
Hypofyse	Mucoviscidose
Indicatie	Natriumdieet
Infectie	Netelroos
Inhaleren	Neten
Innesteling	Neuspoliep
Insufficiëntie	Nicotinesubstitutie
Insuline	Nood anticonceptie
Interactie	NSAID
Irreversibele levernecrose	
	Occlusief verband
Kaliumverlies	Oedeem
Kassacheck	Ontsmetten
Klinisch bewijs	Ontsteking

Ontstekingsremmend	Spijverteringsproblemen
Oogboldruk	Spiraaltje
Oorsuizen	Stofwisselingsprocessen
Ophoesten	Stoornis
Orale conceptiva	Stuipen
Oropharyngeaal	Sucrose
ORS	Sufheid
Overdosering	Suspensie
Overgang	Symptomatische behandeling
Overgevoeligheidsreactie	Symptomen
Parasieten	Taaitslijmziekte
Patiëntenbijsluiter	Talg
Penis	Tandbederf
Pentoxifylline	Tandglazuur
Perforatie van maag of darm	Tandplak
Pessarium	Tandvleesontsteking
Platluis	Therapeutische indicatie
Pollinose	Tinea pedis
Postoperatief	Toedieningsfrequentie
Prikkelhoest	Topicaal
Prostaat	Torpedovormig
Pruritus	Toxisch
Psoriasis	Traditioneel gebruik
Puisten	Transpireren
 	Trombose
Recept	Tuberculose
Resistentie	
Retard werking	UA
Rhinitis sicca	UAD
Risicogroep	Uitdroging
RVG	Uni-dosis
RVH	UR
 	Urinelozing
Sacharose	Urinewegen
Salicylaten	Urticaria
Schaamluis	
Schildklier	Vaatverwijzend
Schimmeldodend	Vaccinatie
Schimmelinfectie	Vaginale afscheiding
Schurft	Vastzittende hoest
Sinusitis	Veneuze insufficiëntie
Slijmvlies	Vergeeten dosis
Smaakstoornissen	Vergiftigingen
Spasmen	Verwardheid

Virus
Vluchtige oliën
Vomeren
Voorbehoedsmiddel
Voorhoofdholte

Waarschuwing
Wazig zien
Weerstand
Werkzame stof
Wetenschappelijk
Wijnvlek

Wisselwerking
Witte bloedlichaampjes

Witte vloed
Wratten

Zelfzorg
Zetpil
Ziekte van Crohn
Ziektekiemdodend
Zwemmerseczeem

Begrippen homeopathie en fytotherapie

Acute middelen
Allopathisch geneesmiddel
Anamnese

Beginverergering

Centesimaal
Chronische middelen
Constitutiemiddel

Decimaal
Dynamiseren

Geneesmiddelbeeld

Klassieke homeopathie
Klinische homeopathie

Modaliteit

Potentiëren

Remmende factoren

Ziektebeeld

Bijlage 4*: Meest risicovolle geneesmiddelen(groepen) met bijbehorende risicowaarschuwingen en adviezen:

Geneesmiddelengroep	Mondelinge risicowaarschuwing als (onderdeel van de) kassacheck	Advies door de (assistent)drogist
NSAID's -acetylsalicylzuur -diclofenac -ibuprofen -naproxen	Dit geneesmiddel kan maagklachten en andere klachten veroorzaken, zeker bij veelvuldig gebruik. De (assistent)drogist kan u hierover informeren.	Risico hangt onder andere af van leeftijd klant, overige medicatie die klant gebruikt en of de klant gevoelig is voor NSAID's. Er zijn alternatieven: In veel gevallen is paracetamol een goed alternatief.
Middelen tegen diarree - loperamide	Zorg dat u bij gebruik van dit geneesmiddel voldoende vocht inneemt, bijvoorbeeld ORS.	U loopt het risico op uitdroging doordat het vocht met de diarree uit het lichaam verdwijnt. ORS bevat zouten en suikers die uw lichaam nodig heeft bij diarree.
Laxeermiddelen - bisacodyl - senna - natriumpicosulfaat	Dit geneesmiddel geeft risico op uitdroging. Ook bestaat het gevaar dat dat de darmen niet meer vanzelf werken ('luie' darmen).	Deze geneesmiddelen innemen met veel water of met ORS. Gebruik laxeermiddelen niet langer dan drie dagen achter elkaar. Werkt het niet voldoende binnen drie dagen? Raadpleeg dan uw arts.
Sint-Janskruid (Hypericum perforatum)	Dit middel kan invloed hebben op de werking van andere geneesmiddelen. Lees de bijsluiter of overleg zo nodig met uw arts of apotheker.	Kruiden, zoals Sint-janskruid, worden ten onrechte als onschuldig beschouwd. Het is belangrijk te weten bij welke geneesmiddelen u Sint-Janskruid niet moet gebruiken. Ook niet bij de anticonceptiepillen, dat is namelijk ook een geneesmiddel.

<p>Paracetamol</p> <ul style="list-style-type: none"> - paracetamol - hot coldrex e.a. 	<p>Houd u aan de maximale dagdosering. Bij overschrijding hiervan kan lever- en nierbeschadiging ontstaan.</p>	<p>Neem bij chronisch gebruik (langer dan 1 maand) maximaal 5 tabletten per dag, bij incidenteel gebruik maximaal 8 tabletten per dag.</p> <p>Bij gebruik van meer dan 15 pijnstillers per maand kan pijnstillerafhankelijke hoofdpijn ontstaan.</p>
<p>Miconazol</p>	<p>Dit geneesmiddel niet gebruiken als u bij de trombosedienst onder controle staat.</p>	<p>Miconazol kan de bloedstolling ontregelen.</p>
<p>Middelen tegen verstopte neus</p> <ul style="list-style-type: none"> - xylometazoline - oxymetazoline - tramazoline (bisolnasal) 	<p>Als u deze geneesmiddelen te lang achter elkaar gebruikt, wordt uw klacht juist erger.</p>	<p>Deze geneesmiddelen maximaal 7 dagen achter elkaar gebruiken, daarna één maand niet.</p>
<p>Hoestmiddelen</p> <ul style="list-style-type: none"> - noscapine - codeïne 	<p>Deze geneesmiddelen beïnvloeden uw reactievermogen. Kijk vooral uit met autorijden of het bedienen van machines.</p> <p>Noscapine niet gebruiken als u bij de trombosedienst onder controle staat.</p>	<p>Codeïne en noscapine werken alleen tegen droge kriebel- of prikkelhoest.</p> <p>Noscapine niet bij een slijmhoest gebruiken. Het onderdrukt de hoestprikkel die nodig is om het slijm op te hoesten.</p> <p>Noscapine kan de bloedstolling ontregelen.</p>
<p>Middelen bij maagklachten</p> <ul style="list-style-type: none"> - omeprazol - pantoprazol 	<p>Als u deze middelen lang achter elkaar gebruikt, kunt u last krijgen van bijwerkingen,</p>	<p>Omeprazol en pantoprazol kunnen bij langdurig gebruik bijwerkingen geven, zoals botontkalking, darminfecties en nierfalen.</p> <p>Gebruik indien mogelijk liever lichtere middelen, of overleg met een arts.</p>
<p>Extra*</p>	<p>* Vanwege privacy redenen is een mondelinge risicowaarschuwing bij de morning-afterpil soms lastig te geven. De risicowaarschuwing kan als alternatief in een flyer meegegeven worden bij de verkoop van de morning-afterpil.</p>	

<p>Morning-afterpil</p>	<p>Als u dit geneesmiddel niet tijdig na onbeschermd geslachtsgemeenschap gebruikt, dan bestaat het risico op ongewenste zwangerschap en verstoring van de menstruatiecyclus.</p>	<p>De maximale termijn waarbinnen u - na onbeschermd geslachtsgemeenschap - deze pil moet innemen bedraagt maximaal drie dagen (72 uur) bij levonorgestrel of vijf dagen (120 uur) bij ulipristal. Verwijs de klant naar de huisarts indien deze termijn is overschreden.</p>
<p>Morning-afterpil met levonorgestrel</p>	<p>Dit geneesmiddel werkt minder goed bij gelijktijdig gebruik van bepaalde andere geneesmiddelen.</p>	<p>Gebruikt u geneesmiddelen tegen epilepsie, tuberculose of HIV, of kruidenmiddelen met Sint-janskruid? Neem dan het dubbele aantal tabletten en overleg zo spoedig mogelijk na inname van de morning-afterpil met uw arts.</p> <p>Als u een andere behandeling wilt, laat dan binnen 5 dagen een koperspiraaltje ('morning-afterspiraaltje') plaatsen door een arts.</p>
<p>Morning-afterpil met ulipristal</p>	<p>Dit geneesmiddel werkt minder goed bij gelijktijdig gebruik van bepaalde andere geneesmiddelen.</p>	<p>Gebruikt u geneesmiddelen tegen maagklachten, gebruik dan een andere morning-afterpil of zorg dat u de morning-afterpil en de maagtabletten niet gelijktijdig inneemt: neem ulipristal in ten minste 12 uur NA een maagtablet zoals ranitidine. Neem ulipristal in ten minste 24 uur NA een maagtablet zoals pantoprazol of omeprazol. Neem ulipristal in ten minste 2 uur VOOR of 4 uur NA een maagtablet zoals Antagel, Gaviscon en Rennie. Overleg bij twijfel met een arts of apotheker.</p> <p>Gebruikt u geneesmiddelen tegen epilepsie, tuberculose of HIV, of</p>

		kruidenmiddelen met Sint-janskruid? Gebruik dan een andere morning- afterpil.
--	--	---

**Bijlage 4 behoort bij eindterm 18 in de exameneisen van Adviseren 1 en is hier toegevoegd omdat deze risicowaarschuwingen bekend worden verondersteld bij de examenkandidaat voor Adviseren 2.*