

## **Pharmacon exameneisen Adviseren compleet - 2018**

### **Wet – en regelgeving (Basiskennis)**

*De kandidaat kan:*

#### Eindterm 1

- De wettelijke adviesplicht voor UAD-geneesmiddelen omschrijven
- De wettelijke adviesfunctie van de (assistent -) drogist omschrijven
- De inhoud van de wettelijke bepalingen uit de Geneesmiddelenwet (art 1, lid t en art 62 ) omschrijven
- Omschrijven welke wettelijke regels gelden bij het ter handstellen van UAD-geneesmiddelen
- Benoemen welke wettelijke regels gelden voor UAD-geneesmiddelen die behoren tot de homeopathica of fytotherapeutica

#### Eindterm 2

- Omschrijven wat de termen UR, UA, UAD en AV betekenen (bijlage 3)
- Omschrijven wanneer een product een geneesmiddel is
  - o Benoemen wat verschillen en overeenkomsten zijn tussen fytotherapie, homeopathie en reguliere geneeskunde
- Omschrijven wat zelfzorg inhoudt
- Omschrijven wat het doel van zelfzorgvoorlichting is
- Omschrijven welke rol UAD-geneesmiddelen binnen de zelfzorg spelen

#### Eindterm 3

- De functie van een bijsluiter omschrijven
- De rubrieken van een bijsluiter en de inhoud daarvan omschrijven
- Het verschil tussen de registratie van RVG en RVH –geneesmiddelen omschrijven

#### Eindterm 5

- Omschrijven wat de kenmerken van voorlichting zijn
- Omschrijven wat de kenmerken van advies zijn
- Omschrijven wat de kenmerken van reclame zijn
- Benoemen wat de verschillen zijn tussen voorlichting, advies en reclame

### **Adviseren over UAD geneesmiddelen algemeen**

#### Eindterm 11

- Omschrijven wat een bijsluiter is
- De functie van een bijsluiter benoemen
- De rubrieken van een bijsluiter benoemen
- De betekenis van de termen uit de bijsluiter die regelmatig door klanten worden gebruikt omschrijven (zie bijlage 3)
- De farmaceutische toedieningsvormen van UAD-geneesmiddelen omschrijven

## Zelfzorgvoorlichting en communicatie

### Eindterm 16

- Benoemen welke informatie van een klant moet worden verkregen om een passend advies te geven (persoon voor wie geneesmiddel is bestemd, aard van de klacht, situatie en eerder ondernomen actie)
- Omschrijven welke vragen aan de klant moeten worden gesteld om een passend advies te geven
- De regels van de communicatieleer omschrijven, die voor adviseren bij zelfzorgmedicatie van belang zijn
- Benoemen wanneer de gesprekstechnieken luisteren, samenvatten of doorvragen worden toegepast
- Benoemen hoe een (assistent) drogist kan inspelen op non verbaal gedrag

### Eindterm 17

- Benoemen wat de functie en het belang van de kassacheck is
- Herkennen in welke situatie een klant behoefte heeft aan advies

### Eindterm 18

- Benoemen in welke situaties de klant moet worden ingelicht over de risico's en gevolgen van gebruik van UAD-geneesmiddelen
- Benoem de belangrijkste zelfzorggeneesmiddelen en werkzame stoffen met een groot risico op verkeerd gebruik of ernstige bijwerkingen of niet geschikt voor bepaalde groepen gebruikers en de bijbehorende verplichte ongevraagde risicowaarschuwing (bijlage 4)

## Adviseren en informeren over UAD-geneesmiddelen per indicatiegebied

### Pijn- en koortsklachten

#### Passend advies geven

#### *De kandidaat kan voor de indicaties:*

- *koorts en pijn bij griep en verkoudheid;*
- *hoofdpijn (ook: spanningshoofdpijn en middelengeïnduceerde hoofdpijn);*
- *symptomen van) migraine;*
- *kiespijn, (pijn bij het) doorkomen van de eerste tanden;*
- *(acute) keelpijn;*
- *desinfectie (ontsmetten) van de mond-/keelholte;*
- *zenuwpijn;*
- *reumatische pijn;*
- *menstruatiepijn;*
- *(pijn bij) artrose;*
- *(milde tot matige) artrose van de knie;*
- *pijn na chirurgische ingrepen (postoperatieve pijn);*

- *koorts en pijn na vaccinatie;*
- *spier- en gewrichtspijn, kneuzingen en verstuikingen;*
- *spit (rugpijn)*

#### Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

#### Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

#### Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

#### Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
  - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

#### Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij pijnklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o Benoemen welke manieren van pijnbestrijding er zijn
  - o Omschrijven hoe algemene pijnstillers werken
  - o Omschrijven hoe lokale pijnstillers werken
  - o Omschrijven wat het verschil in werking is tussen een perifeer of topicaal werkende pijnstiller en een centraal werkende pijnstiller
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

#### Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o De algemene regels en waarschuwingen bij het gebruik van spierwrijfmiddelen benoemen

#### Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

#### Inlichten over gevolgen van gebruik

De kandidaat kan voor de indicaties:

- koorts en pijn bij griep en verkoudheid;
- hoofdpijn (ook: spanningshoofdpijn en middelengeïnduceerde hoofdpijn);
- symptomen van migraine;
- kiespijn, (pijn bij het) doorkomen van de eerste tanden;
- (acute) keelpijn;
- desinfectie (ontsmetten) van de mond-/keelholte;
- zenuwpijn;
- reumatische pijn;
- menstruatiepijn;
- (pijn bij) artrose;
- (milde tot matige) artrose van de knie;
- pijn na chirurgische ingrepen (postoperatieve pijn);
- koorts en pijn na vaccinatie;
- spier- en gewrichtspijn, kneuzingen en verstuikingen;
- spit (rugpijn)

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen bij pijnklachten (bijlage 1 en 2)
  - o Uitleggen wat algemene pijnstillers zijn
  - o Benoemen wat pijnstillende en koortsverlagende stoffen zijn (zie bijlage 2)
  - o Benoemen wat ontstekingsremmende stoffen zijn (zie bijlage 2)
  - o Benoemen wat middelen bij desinfectie (ontsmetten) van de mond-/keelholte zijn (zie bijlage 1)
  - o Benoemen wat specifieke werkzame stoffen bij pijn, griep en menstruatiepijn zijn (zie bijlage 2)
  - o Omschrijven wat een combinatiepreparaat is
  - o Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in de UAD-geneesmiddelen bij pijn- en koortsklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o Uiteenzetten wat (over)gevoeligheid voor pijnstillers voor gevolgen heeft voor pijnbestrijding
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen bij pijn, koorts en griep (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)
  - o Uiteenzetten wat (over)gevoeligheid voor pijnstillers voor gevolgen heeft voor pijnbestrijding

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o De algemene regels en waarschuwingen bij het gebruik van spierwrijfmiddelen benoemen

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen de beschikbare UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van een beschikbaar UAD-geneesmiddel

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

## **Verkoudheidsklachten**

### Passend advies geven

*De kandidaat kan voor de indicaties:*

- *(allergische) rhinitis (neusslijmvliesontsteking);*
- *bijholteontsteking (sinusitis);*
- *middenoorontsteking;*
- *hooikoorts (pollinose);*
- *verkoudheid, verstopte neus, loopneus;*
- *hoest (droge hoest en productieve hoest)*

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
  - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij verkoudheidsklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik:

*De kandidaat kan voor de indicaties:*

- *(allergische) rhinitis (neusslijmvliesontsteking);*
- *bijholteontsteking (sinusitis);*
- *middenoorontsteking;*
- *hooikoorts (pollinose);*
- *verkoudheid, verstopte neus, loopneus;*
- *hoest (droge hoest en productieve hoest)*

#### Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o Benoemen wat middelen bij neusslijmvliesontsteking zijn (zie bijlage 1)
  - o Benoemen wat middelen bij pollinose zijn (zie bijlage 1)
  - o Benoemen welke neusdruppels en –sprays en tabletten er zijn (zie bijlage 1)
  - o Benoemen welke inhalatieproducten er zijn (zie bijlage 1)
  - o Benoemen welke middelen er bij verschillende soorten hoest zijn (zie bijlage 1)
  - o Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in UAD-geneesmiddelen bij verkoudheidsklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

#### Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD) geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

#### Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van UAD-geneesmiddelen (bijlage 1)

Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van een UAD-geneesmiddel

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

## **Maag- en darmklachten**

### Passend advies geven

*De kandidaat kan voor de indicaties:*

- *brandend maagzuur (zuurbranden), zure oprispingen, hyperaciditeit (teveel zuur in maag en slokdarm);*
- *flatulentie (winderigheid);*
- *opgeblazen gevoel;*
- *misselijkheid (braken, spugen);*
- *obstipatie (verstopping, hardlijvigheid);*
- *(acute) diarree;*
- *worminfecties(aarsmaden, lintwormen);*
- *aambeien*

Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
  - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij maag- en darmklachten (bijlage 1 en 2)
  - o Benoemen welke soorten maagmiddelen er zijn
  - o Benoemen welke soorten laxeermiddelen er zijn



- Benoemen welke soorten aambeimiddelen er zijn
- Benoemen welke soorten diarreemiddelen er zijn
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

#### Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

#### Inlichten over gevolgen van gebruik

##### *De kandidaat kan voor de indicaties:*

- *brandend maagzuur (zuurbranden), zure oprispingen, hyperaciditeit (teveel zuur in maag en slokdarm);*
- *flatulentie (winderigheid);*
- *opgeblazen gevoel;*
- *misselijkheid (braken, spugen);*
- *obstipatie (verstopping, hardlijvigheid);*
- *(acute) diarree;*
- *worminfecties(aarsmaden, lintwormen);*
- *aambeien*

#### Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - Benoemen wat antacida zijn (zie bijlage 1)
  - Benoemen wat 'laagjes-vormers' zijn (zie bijlage 1)
  - Benoemen wat carminativa zijn (zie bijlage 1)
  - Benoemen wat H<sub>2</sub>-antagonisten zijn (zie bijlage 1)
  - Benoemen wat protonpompremmers zijn (zie bijlage 1)
  - Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in UAD-geneesmiddelen bij maag- en darmklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)

- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

-

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van UAD-geneesmiddelen (bijlage 1)

Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van een UAD-geneesmiddel

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

## Huidklachten

### Passend advies geven

*De kandidaat kan voor de indicaties:*

- *desinfectie (ontsmetten) van huid en wonden;*
- *koortslip (herpes labialis, koortsuitslag, koortsblaasjes);*
- *schimmelinfectie, zwemmerseczeem (tinea pedis, voetschimmel);*
- *wratten, likdoorns (eksterogen), steenpuist;*
- *(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken;*
- *luijeruitslag;*

- *huiduitslag (eczeem, dauwworm), acne;*
- *hoofdluis*

#### Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

#### Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

#### Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

#### Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
  - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn
    - virale aandoeningen van de opperhuid
    - bacteriële aandoeningen van de opperhuid
    - schimmelaandoeningen van de opperhuid
    - afwijkingen in de verhoorning van de opperhuid
    - afwijkingen in de talgklierfunctie van de lederhuid
    - de relatie tussen micro-organismen en huidaandoeningen
    - de belangrijkste soorten micro-organismen
    - de invloed van de belangrijkste soorten micro-organismen op de huid

#### Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij huidklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

#### Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o De basisprincipes van reiniging en ontsmetting van de huid uiteenzetten

#### Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *desinfectie (ontsmetten) van huid en wonden;*
- *koortslip (herpes labialis, koortsuitslag, koortsblaasjes);*
- *schimmelinfectie, zwemmerseczeem (tinea pedis, voetschimmel);*
- *wratten, likdoorns (eksterogen), steenpuist;*
- *(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken;*
- *luieruitslag;*
- *huiduitslag (eczeem, dauwworm), acne;*
- *hoofdluis*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen bij huidklachten (bijlage 1 en 2)
  - o Benoemen wat reinigings- en ontsmettingsmiddelen voor de huid zijn (bijlage 1)
  - o Benoemen welke UAD-geneesmiddelen er zijn bij huidklachten (bijlage 1)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

### **Overige indicaties**

(kinderziektes, stoppen met roken, nervositeit, reisziekte, noodanticonceptie en vaginale schimmelinfecties)

#### Passend advies geven

*De kandidaat kan voor de overige indicaties waaronder valt:*

- *kinderziekten;*
- *nicotinesubstitutie (stoppen met roken);*
- *psychische klachten;*
- *reisziekte;*
- *morningafterpil;*
- *overgangsklachten;*
- *tanden en mond;*
- *vaginale schimmelinfecties;*
- *urinewegproblemen*

#### Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

#### Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

#### Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

#### Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
  - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

#### Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o Omschrijven wat de belangrijkste aspecten van de noodanticonceptiepil zijn

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik

*De kandidaat kan voor de overige indicaties waaronder valt:*

- *kinderziekten;*
- *nicotinesubstitutie (stoppen met roken);*
- *psychische klachten;*
- *reisziekte;*
- *morningafterpil;*
- *overgangsklachten;*
- *tanden en mond;*
- *vaginale schimmelinfecties;*
- *urineproblemen*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

## Homeopathie

Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10c

- De essentie van de homeopathie samenvatten
- De basisprincipes van de homeopathie omschrijven
  - o Op hoofdlijnen uitleggen hoe homeopathica werken
  - o Omschrijven aan welke eisen de toediening moet voldoen
  - o Omschrijven wat een homeopathisch simplex is
  - o Omschrijven wat een homeopathisch complex is
- Benoemen welke specifieke risico's kunnen gelden voor homeopathica
- Benoemen welke groep aandoeningen met name geschikt is voor homeopathische behandeling
- Benoemen welke UAD-geneesmiddelen behoren tot de RVH-homeopathische of RVH-fytotherapeutische geneesmiddelen (zie bijlage 1)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)



## **Bijlage 1**

### **Producten – 2018**

#### **Pijn en koorts**

- Advil
- Aleve Classic
- Aleve Select
- Alka-Seltzer
- Aspirine 100 en 500
- Aspro 500 Bruis
- Daro hoofdpijnpoeder
- Finimal
- Nurofen
- Nurofen Fastine
- Nurofen voor kinderen
- Panadol
- Panadol Junior
- Panadol Plus
- Panadol Zapp
- Roter APC
- Roter Paracetamol
- Roter Paracetamol Junior
- Roter Paracof
- Sanalgin
- Sarixell
- Saridon
- Sinaspril
- Voltaren K
- Witte Kruis

#### **Migraine**

- Nurofen Migraine
- Excedrin

#### **Griep**

- A. Vogel Echinaforce
- Antigrippine
- Aspirine-C
- Citrosan
- Hot Coldrex

#### **Kiespijn en pijn bij het doorkomen van eerste tanden**

- Dentinox

#### **Keelpijn**

- Strepfen zuigtablet
- Strepfen keelspray
- Vick Farinex

#### **Menstratiepijn**

- Aleve Feminax
- Nurofen Female

#### **Artrose**

- Glucosamine Pharma Nord
- Voltaren Emulgel

#### **Spier en gewrichtspijn**

- A. Vogel Atrosan tabletten
- Roter Harpago

#### **Oorpijn**

- Otagan

#### **Allergische rhinitis**

- Allerfre
- Reactine
- Prevalin
- Allergo-COMOD

#### **Verkoudheid, verstopte neus, loopneus**

- Bisolnasal
- Dampo Verkoudheidsbalsem
- Luuf Verkoudheidsbalsem
- Otrivin

- Otrivin Duo
- Vicks Sinex
- Vicks Vaporub

#### **Droge hoest**

- Fluitussin
- Natterman Bronchicum Extra Sterk
- Natterman Noscasan
- Roter Noscapect
- Bisolnex

#### **Productieve hoest**

- Mucodyne Adult
- Natterman Bronchicum
- Bisolhelix
- A.Vogel Drosinula

#### **Hoest algemeen**

- Bronchostop hoestdrank
- Bronchostop hoestpastilles

#### **Maagzuur (met flatulentie, opgeblazen gevoel)**

- Ipraalox
- Losecosan 20 mg
- Pantozol Control
- Nexium Control
- Regla pH kauwtablet
- Rennie Deflatine
- Rennie Suikervrij
- Zantac 75

#### **Maagkrampen**

- Buscopan
- Buscopan zetpillen
- Buscopan zetpillen voor kinderen
- Tempocol

#### **Maagklachten algemeen (dyspepsie)**

- Iberogast

#### **Obstipatie**

- Dulcodruppels
- Dulcolax
- Dulcolax zetpillen 10 mg
- Dulcopearls
- Lactulosesiroop
- Metamucil Suikervrij
- Microlax

#### **Diarree**

- Imodium drank
- Losimed Duo

#### **Aambeien**

- A. Vogel Aesculaforce
- A. Vogel Hamameliszalf
- EpiAnal
- Sperti
- Theranal

#### **Desinfectie**

- Betadine Oplossing
- Betadine Scrub
- Betadine Shampoo
- Betadine Zalf
- Betadine Zalfgaas
- Dettol Med Chloorxylenol
- Dettol Sterilon

#### **Schimmelinfectie**

- Canesten Skin
- Daktarin
- Daktarin Nagellak
- Lamisil
- Lamisil Once

#### **Wratten**

- Formule W
- Duofilm

#### **(jeuk en pijn bij) Insectenbeten en –steken**

- Nestosyl

#### **Huidklachten**

- Daro Trekzalf
- Daro Zinkzalf

#### **Hoofdhuidklachten**

- Selsun

#### **Hoofdluis**

- Loxazol
- XT Luis
- Prioderm lotion

#### **Nicotinesubstitutie**

- Nicorette
- Nicotinell
- NiQuitin

#### **Nervositeit**

- Valdispert 45 mg
- Valdispert 450 mg

#### **Reisziekte**

- Primatour
- Suprimal

#### **Noodanticonceptie**

- NorLevo
- EllaOne

#### **Tandcariës**

- Corsodyl mondspoeling
- Corsodyl tandgel
- Hextril
- Pyralvex

#### **Vaginale schimmelinfecties**

- Canesten Gyno

#### **Urinewegproblemen**

- Granufink Femina
- Granufink Prosta
- Granufink Prosta Forte
- Roter Uva-Ursi

#### **Homeopathie**

- A. Vogel Alchemilla complex
- A. Vogel Arnica D6
- A. Vogel Avena sativa complex
- A. Vogel Belladonna D4
- A. Vogel Cinuforce
- A. Vogel Famosan
- A. Vogel Nux vomica D4
- A. Vogel Passiflora complex
- A. Vogel Pollinosan
- A. Vogel Thuja D6
- HEEL Traumeel S
- Oscillococcinum
- VSM Arnica Montana D6
- VSM Nisyleen
- VSM Okugest
- VSM Tonsiotreen
- VSM Tussistin
- VSM Kind Chamodent
- VSM Kind Cinababy
- VSM Kind Kindigest
- VSM Kind Kindival
- VSM Kind Nisykind tabletten
- VSM Kind Tussikind siroop

#### **Fytotherapie**

- A. Vogel Aesculaforce
- A. Vogel Dormeasan
- A. Vogel Drosera complex
- A. Vogel Geriaforce
- A. Vogel Solidago complex
- A. Vogel Thuja ø
- A. Vogel Valeriaan ø = D1
- A. Vogel crème Bioforce

## Bijlage 2

### Werkzame stoffen – 2018

#### Pijn en koorts

- Acetylsalicylzuur
- Coffeïne
- Diclofenac kalium
- Ibuprofen
- Naproxennatrium
- Paracetamol
- Propyfenazon

#### Migraine

- Acetylsalicylzuur
- Cafeïne
- Ibuprofen
- Paracetamol

#### Griep

- Acetylsalicylzuur
- Ascorbinezuur
- Coffeïne
- Echinacea purpurea
- Paracetamol

#### Kiespijn en pijn bij het doorkomen van eerste tanden

- Lidocaïnehydrochloride

#### Keelpijn

- Ambroxolhydrochloride
- Amylmetacresol
- Benzydaminehydrochloride
- Chloorhexidine
- Dequaliniumdichloride
- Dichloorbenzylalcohol
- Flurbiprofen
- Lidocaïnehydrochloride
- Propylparahydroxybenzoaat

#### Menstruatiepijn

- Ibuprofen
- Naproxennatrium

#### Artrose

- Calciumcarbonaat
- Diclofenac diethylamine
- Glucosamine

#### Spier en gewrichtspijn

- Benzydaminehydrochloride
- Harpagophytum radix

#### Oorpijn

- Lidocaïnehydrochloride

#### Allergische rhinitis

- Cetirizinehydrochloride
- Dinatriumcromoglicaat
- Loratadine

#### Verkoudheid, verstopte neus, loopneus

- Bergdenolie
- Dennennaaldenolie
- Eucalyptusolie
- Ipratropiumbromide
- Kamfer
- Levomenthol
- Majoranaolie
- Oxymetazolinehydrochloride
- Terpentijnolie
- Thymol
- Tramazolinehydrochloride
- Xylometazolinehydrochloride
- Zoutoplossing 0,9 % en 2,2 %

### **Droge hoest**

- Codeïnefosfaat
- Noscapinehydrochloride

### **Productieve hoest**

- Acetylcysteïne
- Broomhexinehydrochloride
- Carbocisteïne
- Drosera rotundifolia
- Dactylopius coccus
- Hedera helix
- Picea excelsa
- Inula helenium
- Cephaelis ipecacuanha

### **Hoest algemeen**

- Althaeae
- Hederae helices extractum
- Thyme

### **Maagzuur (met flatulentie, opgeblazen gevoel)**

- Alginezuur
- Aluminiumhydroxide
- Aluminiumoxide
- Bismuthsubnitraat
- Calciumcarbonaat
- Famotidine
- Kaliumwaterstofcarbonaat
- Magnesiumcarbonaat
- Magnesiumhydroxide
- Natriumalgiinaat
- Natriumwaterstofcarbonaat
- Omeprazol
- Esomeprazol
- Pantoprazol natrium
- Ranitidinehydrochloride
- Simethicon

### **Maagkrampen**

- Butylscopolaminebromide
- Pepermuntolie

### **Maagklachten algemeen (dyspepsie)**

- Angelica radix
- Carvi fructus
- Chelidonii herba
- Iberis amara
- Liquiritiae radix
- Matricariae chamomillae flos
- Melissa folium
- Menthae piperitae folium
- Silybi mariani fructus

### **Obstipatie**

- Bisacodyl
- Dexpantenol
- Lactulose
- Natriumlaurylsulfaat
- Natriumpicosulfaat
- Psylliumvezels
- Senna fructus
- Sorbitol

### **Diarree**

- Glucose
- Kaliumchloride
- Kool, geactiveerd
- Loperamidehydrochloride
- Natriumchloride
- Natriumwaterstofcitraat
- Simeticon

### **Wormpjes (aarsmaden)**

- Mebendazol

### **Aambeien**

- Aesculi hippocastani extractum
- Bismuthsubnitraat
- Echinacea
- Hyperici floris
- Iecoris negrapionis oleum
- Lidocaïne

- Saccharomyces vivi extractum
- Natriumoleaat
- Polidocanol
- Zinkoxide

#### **Acne**

- Benzoylperoxide
- Miconazolnitraat

#### **Desinfectie**

- Benzalkoniumchloride
- Chloorhexidinedigluconaat
- Chloorxylenol
- Povidon jodium

#### **Koortslip**

- Aciclovir
- Penciclovir

#### **Schimmelinfectie**

- Clotrimazol
- Miconazolnitraat
- Terbinafinehydrochloride

#### **Wratten**

- Melkzuur
- Salicylzuur

#### **(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken**

- Pramocaïne
- Tripelennaminehydrochloride
- Zinkoxide

#### **Huidklachten**

- Sulfobituminose-ammonium
- Zinkoxide

#### **Hoofdhuidklachten**

-

- Seleniumsulfide

#### **Hoofdluis**

- Dimeticon
- Permethrine
- Malation

#### **Nicotinesubstitutie**

- Nicotine

#### **Nervositeit**

- Valeriana extractum

#### **Reisziekte**

- Chloorcyclizinehydrochloride
- Cinnarizine
- Meclozinehydrochloride

#### **Noodanticonceptie**

- Levonorgestrel
- Ulipristal acetaat

#### **Tandcariës**

- Chloorhexidinedigluconaat
- Hexetidine
- Natriumfluoride
- Rhei extractum
- Salicylzuur

#### **Vaginale schimmelinfecties**

- Clotrimazol

#### **Urinewegproblemen**

- Arctostaphylos uvaursi folium (berendruifblad)
- Pompoenpitextract
- Pompoenpitolie

### Homeopathie

- Aconitum napellus
- Alchemilla vulgaris
- Ammi visnaga
- Antimonium sulfuratum auratum
- Arnica montana
- Arsenicum album
- Avena sativa
- Belladonna
- Bryonia alba
- Bryonia cretica
- Calendula officinalis
- Carbo vegetabilis
- Cardiospermum halicacabum
- Chamomilla
- Cimicifuga racemose
- Cinnabaris
- Drosera rotundifolia
- Echinacea angustifolia
- Eucalyptus globulus
- Eupatorium perfoliatum
- Guajacum officinale
- Hepar sulfur
- Hypericum perforatum
- Ignatia amara
- Ipecacuanha
- Kalium bichromicum
- Lachesis mutus
- Luffa operculata
- Melissa officinalis
- Mercurius iodatus ruber
- Nux vomica
- Okoubaka aubrevillei
- Panax ginseng
- Passiflora incarnata
- Phosphorus
- Pulsatilla pratensis
- Sepia officinalis
- Silicea
- Symphytum officinalis
- Thuja occidentalis
- Valeriana officinalis

### Fytotherapie

- Aesculi hippocastani extractum
- Arnica montana
- Avena sativa
- Calendula officinalis
- Drosera rotundifolia
- Echinacea purpurea
- Ginkgo biloba
- Hamamelidis extract
- Hyperici floris
- Ipecacuanha
- Melissa officinalis
- Passiflora incarnata
- Solidago virgaurea
- Thuja occidentale
- Thymus vulgaris
- Valeriana officinalis
- Viola tricolor



## Bijlage 3

### Terminologie – 2018

#### Adviseren 1

Aambeien	Bloedstolling
Aanbevolen dosering	Bloeduitstorting
Aandoening	Bloedverduunners
Accidentele overdosering	Braken
ACE-remmers	Breed werkingsgebied
Acuut	Bruistablet
Adolescent	
Advies	Candida albicans
Afweersysteem	CBG
Alcoholisme	Chirurgische ingreep
Allergische reactie	Chronische aandoening
Antagonist	Coma
Antibioticum	Combinatiegeneesmiddel
Anticoagulantia	Communicatieleer
Antidepressiva	Contra-indicatie
Antistollingsmiddelen	Coördinatieproblemen
Antiviraal	Corticosteroïde
Anus	Criteria
Applicator	
Artritis	Dagdosering
Artrose	Desinfectans
Ascorbinezuur	Desoriëntatie
Aspartaam	Diabetici
Astma	Diuretica
Auto-immuunziekte	Doktersvoorschrift
AV	Doseringsschema
	Dosis
Baarmoeder	Dragee
Bacteriële infectie	Duizeligheid
Bacteriën	Dyspepsie
Benzoaat	
Beroerte	Effecten
Bètablokker	Effectieve dosering
Bewusteloosheid	Emulgel
Bewustzijn	Emulsie
Bijwerking	Enzym
Bloedbeeld	Exantheem
Bloedcirculatie	
Bloeddruk	Farmaceutisch

Farmacokinetische	Kortademigheid
Filmomhulde tablet	Lactatie
Funciestoornis	Lapp-lactase deficiëntie
Fysisch	Liquid capsule
Fytotherapeutica	Lokaal
Galactosemie	Longblaasjes
Galbulten	Longemfyseem
Gastro oesofageale reflux	Maagsapresistent
Geelzucht	MAO-remmers
Geneesmiddel	Medisch hulpmiddel
Geneeswijze	Megacolon
Gesuperviseerd	Methotrexaat
Giften	Micro-organisme
Glaucoom	Misselijkheid
Glucose	Motiliteit
Haarvat	Natriumdieet
Hallucinatie	Netelroos
Hartfalen	NSAID
Hartritmestoornissen	Oedeem
Hemolytische anemie	Omhulde tablet
Heparine	Oropharyngeaal
Hersenbloeding	Overdosering
Histamine	Overgevoeligheidsreactie
Homeopathica	Parasieten
Homeopathisch geneesmiddel	Patiëntenbijsluiter
Huiduitslag	Pentoxifylline
Hulpstof	Postoperatief
Hyperaciditeit	Pruritus
Hypertensie	Recept
Hyperventilatie	Rectaal
Hypofyse	Retard werking
Indicatie	Risicogroep
Infectie	RVG
Insufficiëntie	RVH
Insuline	Sachet
Interactie	Schildklier
Irreversibele levernecrose	Smelttablet
Kaliumverlies	Spasmen
Kassacheck	
Klinisch bewijs	
Klyisma	

Stoornis  
 Sucrose  
 Sufheid  
 Suspensie  
 Symptomatische behandeling  
 Symptomen

Ter handstellen  
 Therapeutische indicatie  
 Toedieningsfrequentie  
 Topicaal  
 Torpedovormig  
 Toxisch  
 Traditioneel gebruik  
 Transpireren  
 Trombose  
 Tuberculose

UA  
 UAD  
 Uitdroging  
 Uni-dosis  
 UR

Urinelozing  
 Urinewegen  
 Urticaria

Vaatverwijdend  
 Vergeten dosis  
 Vergiftigingen  
 Verwardheid  
 Vomeren  
  
 Waarschuwing  
 Wazig zien  
 Weerstand  
 Werkzame stof  
 Wetenschappelijk  
 Wisselwerking  
 Witte bloedlichaampjes

Zelfzorg  
 Zetpil  
 Ziekte van Crohn

### **Bijlage 3**

#### **Terminologie – 2018**

#### **Adviseren 2**

Aanbevolen dosering  
 Accidentele overdosering  
 Acuut  
 Aderen  
 Adolescent  
 Aften  
 Afweersysteem  
 Allergische reactie  
 Allergische rhinitis  
 Antagonist  
 Anticonceptie  
 Antidepressiva  
 Antihistaminica  
 Antimycotica  
 Antistollingsmiddelen  
 Antiviraal

Anus  
 Ascorbinezuur  
 Aspirator  
 Astma  
 AV  
  
 Baarmoeder  
 Bacteriële infectie  
 Bacteriën  
 Beginverergering  
 Benauwdheid  
 Beroerte  
 Bewegingsziekte  
 Bijwerking  
 Bloedingstijd  
 Bloedneus

Bloedplaatjes	Galbulten
Bloedstolling	Gastro oesofageale reflux
Bloedverduunners	Geelzucht
Braken	Geneesmiddel
Breed werkingsgebied	Geneeswijze
Bronchiaal	Geslachtsgemeenschap
Buitenbaarmoederlijke zwangerschap	Geslachtsorganen
Bypass	Gestandaardiseerd plantenextract
	Giften
Candida albicans	Glaucoom
Cervixkapje	Gluten
Chronische aandoening	
Coïtus interruptus	H1 antagonist
Combinatiegeneesmiddel	Haarvat
Condoom	Hallucinatie
Coördinatieproblemen	Hartfalen
Criteria	Hartritmestoornissen
	Hemolytische anemie
Dagdosering	Heparine
Desoriëntatie	Herpes labialis
Diabetici	Herpes simplex
Diuretica	Hersenbloeding
Doktersvoorschrift	Histamine
Doseringsschema	Hoestonderdrukkend
Dosis	Hoestprikkel
Droge hoest	Homeopathica
Duizeligheid	Homeopathisch geneesmiddel
Dyspepsie	Hooikoorts
	Hormonaal
Eczeem	Huiduitslag
Effecten	Hulpstof
Effectieve dosering	Hyperaciditeit
Eierstokken	Hypertensie
Eksteroïden	Hyperventilatie
Evenwichtsstoornissen	Hypofyse
Exantheem	
Extract	Indicatie
	Infectie
Fenylalanine	Inhaleren
Fenylketonurie	Innesteling
Functiestoornis	Insufficiëntie
Fytotherapeutica	Insuline
Fytotherapeutisch geneesmiddel	Interactie
	Irreversibele levernecrose
Galactosemie	

Kaliumverlies	Oedeem
Kassacheck	Ontsmetten
Klinisch bewijs	Ontsteking
Klyasma	Ontstekingsremmend
Koortslip	Oogboldruk
Kortademigheid	Oorsuizen
Kruidengeneesmiddel	Ophoesten
Kruidentincturen	Orale conceptiva
	Oropharyngeaal
Lactatie	ORS
Lactose intolerantie	Overdosering
Lapp-lactase deficiëntie	Overgang
Lokaal	Overgevoeligheidsreactie
Longblaasjes	
Longemfyseem	Parasieten
Loopneus	Patiëntenbijsluiter
Luieruitslag	Penis
Luizen	Pentoxifylline
	Perforatie van maag of darm
Maagsapresistent	Pessarium
Maagzweer	Platluis
MAO-remmers	Pollinose
Medisch hulpmiddel	Postoperatief
Mee-eter	Prikkelhoest
Megacolon	Prostaat
Melksuiker	Pruritus
Methotrexaat	Psoriasis
Micro-organisme	Puisten
Miskraam	
Misselijkheid	Recept
Moedervlek	Resistentie
Mondzweren	Retard werking
Motiliteit	Rhinitis sicca
Mucolytica	Risicogroep
Mucoviscidose	RVG
	RVH
Natriumdieet	
Netelroos	Sacharose
Neten	Salicylaten
Neuspoliep	Schaamluis
Nicotinesubstitutie	Schilddklier
Nood anticonceptie	Schimmeldodend
NSAID	Schimmelinfectie
	Schurft
Occlusief verband	Sinusitis

Slijmvlies	Urinelozing
Smaakstoornissen	Urinewegen
Spasmen	Urticaria
Spijsverteringsproblemen	
Spiraaltje	Vaatverwijdend
Stofwisselingsprocessen	Vaccinatie
Stoornis	Vaginale afscheiding
Stuipen	Vastzittende hoest
Sucrose	Veneuze insufficiëntie
Sufheid	Vergeten dosis
Suspensie	Vergiftigingen
Symptomatische behandeling	Verwardheid
Symptomen	Virus
	Vluchtige oliën
Taaistijmziekte	Vomeren
Talg	Voorbehoedsmiddel
Tandbederf	Voorhoofdholte
Tandglazuur	
Tandplak	Waarschuwing
Tandvleesontsteking	Wazig zien
Therapeutische indicatie	Weerstand
Tinea pedis	Werkzame stof
Toedieningsfrequentie	Wetenschappelijk
Topicaal	Wijnvlek
Torpedovormig	Wisselwerking
Toxisch	Witte bloedlichaampjes
Traditioneel gebruik	Witte vloed
Transpireren	Wratten
Trombose	
Tuberculose	Zelfzorg
	Zetpil
UA	Ziekte van Crohn
UAD	Ziektekiemdodend
Uitdroging	Zwemmerseczeem
Uni-dosis	
UR	

## Begrippen homeopathie en fytotherapie

Acute middelen	Centesimaal
Allopathisch geneesmiddel	Chronische middelen
Anamnese	Constitutiemiddel
Beginverergering	Decimaal

Dynamiseren

Geneesmiddelbeeld

Klassieke homeopathie

Klinische homeopathie

Modaliteit

Potentiëren

Remmende factoren

Ziektebeeld

## Bijlage 4: Meest risicovolle geneesmiddelen(groepen) met bijbehorende risicowaarschuwingen en adviezen:

Geneesmiddelengroep	Mondelinge risicowaarschuwing als (onderdeel van de) kassacheck	Advies door de (assistent)drogist
<b>NSAID's</b> -acetylsalicylzuur -diclofenac -ibuprofen -naproxen	Dit geneesmiddel kan maagklachten en andere klachten veroorzaken, zeker bij veelvuldig gebruik.  De (assistent)drogist kan u hierover informeren.	Risico hangt onder andere af van leeftijd klant, overige medicatie die klant gebruikt en of de klant gevoelig is voor NSAID's.  Er zijn alternatieven: In veel gevallen is paracetamol een goed alternatief.
<b>Middelen tegen diarree</b>  - loperamide	Zorg dat u bij gebruik van dit geneesmiddel voldoende vocht inneemt, bijvoorbeeld ORS.	U loopt het risico op uitdroging doordat het vocht met de diarree uit het lichaam verdwijnt. ORS bevat zouten en suikers die uw lichaam nodig heeft bij diarree.
<b>Laxeermiddelen</b>  - bisacodyl - senna - natriumpicosulfaat	Dit geneesmiddel geeft risico op uitdroging. Ook bestaat het gevaar dat dat de darmen niet meer vanzelf werken ('luie' darmen).	Deze geneesmiddelen innemen met veel water of met ORS.  Gebruik laxeermiddelen niet langer dan drie dagen achter elkaar. Werkt het niet voldoende binnen drie dagen? Raadpleeg dan uw arts.
<b>Sint-Janskruid (Hypericum perforatum)</b>	Dit middel kan invloed hebben op de werking van andere geneesmiddelen. Lees de bijsluiters of overleg zo nodig met uw arts of apotheker.	Kruiden, zoals Sint-janskruid, worden ten onrechte als onschuldig beschouwd.  Het is belangrijk te weten bij welke geneesmiddelen u Sint-Janskruid niet moet gebruiken. Ook niet bij de anticonceptiepillen, dat is namelijk ook een geneesmiddel.
<b>Paracetamol</b>  - paracetamol - hot coldrex e.a.	Houd u aan de maximale dagdosering. Bij overschrijding hiervan kan lever- en nierbeschadiging ontstaan.	Neem bij chronisch gebruik (langer dan 1 maand) maximaal 5 tabletten per dag, bij incidenteel gebruik maximaal 8 tabletten per dag.  Bij gebruik van meer dan 15



		pijnstillers per maand kan pijnstillerafhankelijke hoofdpijn ontstaan.
<b>Miconazol</b>	Dit geneesmiddel niet gebruiken als u bij de trombosedienst onder controle staat.	Miconazol kan de bloedstolling ontregelen.
<b>Middelen tegen verstopte neus</b>  - xylometazoline - oxymetazoline - tramazoline (bisolnasal)	Als u deze geneesmiddelen te lang achter elkaar gebruikt, wordt uw klacht juist erger.	Deze geneesmiddelen maximaal 7 dagen achter elkaar gebruiken, daarna één maand niet.
<b>Hoestmiddelen</b>  - noscapine - codeïne	Deze geneesmiddelen beïnvloeden uw reactievermogen. Kijk vooral uit met autorijden of het bedienen van machines.  Noscapine niet gebruiken als u bij de trombosedienst onder controle staat.	Codeïne en noscapine werken alleen tegen droge kriebel- of prikkelhoest.  Noscapine niet bij een slijmhoest gebruiken. Het onderdrukt de hoestprikkel die nodig is om het slijm op te hoesten.  Noscapine kan de bloedstolling ontregelen.
<b>Middelen bij maagklachten</b>  - omeprazol - pantoprazol	Als u deze middelen lang achter elkaar gebruikt, kunt u last krijgen van bijwerkingen,	Omeprazol en pantoprazol kunnen bij langdurig gebruik bijwerkingen geven, zoals botontkalking, darminfecties en nierfalen.  Gebruik indien mogelijk liever lichtere middelen, of overleg met een arts.
<b>Extra*</b>	* Vanwege privacy redenen is een mondelinge risicowaarschuwing bij de morning-afterpil soms lastig te geven. De risicowaarschuwing kan als alternatief in een flyer meegegeven worden bij de verkoop van de morning-afterpil.	
<b>Morning-afterpil</b>	Als u dit geneesmiddel niet tijdig na onbeschermd geslachtsgemeenschap gebruikt, dan bestaat het risico op ongewenste zwangerschap en verstoring van de menstruatiecyclus.	De maximale termijn waarbinnen u - na onbeschermd geslachtsgemeenschap - deze pil moet innemen bedraagt maximaal drie dagen (72 uur) bij levonorgestrel of vijf dagen (120 uur) bij ulipristal. Verwijs de klant naar de huisarts indien deze termijn is overschreden.
<b>Morning-afterpil met levonorgestrel</b>	Dit geneesmiddel werkt minder goed bij gelijktijdig gebruik van bepaalde andere geneesmiddelen.	Gebruikt u geneesmiddelen tegen epilepsie, tuberculose of HIV, of kruidenmiddelen

		<p>met Sint-janskruid? Neem dan het dubbele aantal tabletten en overleg zo spoedig mogelijk na inname van de morning-afterpil met uw arts.</p> <p>Als u een andere behandeling wilt, laat dan binnen 5 dagen een koperspiraaltje ('morning-afterspiraaltje') plaatsen door een arts.</p>
<p><b>Morning-afterpil met ulipristal</b></p>	<p>Dit geneesmiddel werkt minder goed bij gelijktijdig gebruik van bepaalde andere geneesmiddelen.</p>	<p>Gebruikt u geneesmiddelen tegen maagklachten, gebruik dan een andere morning-afterpil of zorg dat u de morning-afterpil en de maagtabletten niet gelijktijdig inneemt: neem ulipristal in ten minste 12 uur NA een maagtablet zoals ranitidine. Neem ulipristal in ten minste 24 uur NA een maagtablet zoals pantoprazol of omeprazol. Neem ulipristal in ten minste 2 uur VOOR of 4 uur NA een maagtablet zoals Antagel, Gaviscon en Rennie. Overleg bij twijfel met een arts of apotheker.</p> <p>Gebruikt u geneesmiddelen tegen epilepsie, tuberculose of HIV, of kruidenmiddelen met Sint-janskruid? Gebruik dan een andere morning- afterpil.</p>