

## Pharmacon exameneisen Doorstroom Drogist - 2018

### Zelfzorgvoorlichting en communicatie

Eindterm 18

- Benoemen in welke situaties de klant moet worden ingelicht over de risico's en gevolgen van gebruik van UAD-geneesmiddelen
- Benoem de belangrijkste zelfzorggeneesmiddelen en werkzame stoffen met een groot risico op verkeerd gebruik of ernstige bijwerkingen of niet geschikt voor bepaalde groepen gebruikers en de bijbehorende verplichte ongevraagde risicowaarschuwing (bijlage 4)

### Adviseren en informeren over UAD-geneesmiddelen per indicatiegebied

#### Pijn- en koortsklachten

##### Passend advies geven

De kandidaat kan voor de indicaties:

- koorts en pijn bij griep en verkoudheid;
- hoofdpijn (ook: spanningshoofdpijn en middelengeïnduceerde hoofdpijn);
- symptomen van migraine;
- kiespijn, (pijn bij het) doorkomen van de eerste tanden;
- (acute) keelpijn;
- zenuwpijn;
- reumatische pijn;
- menstruatiepijn;
- (pijn bij) artrose;
- (milde tot matige) artrose van de knie;
- pijn na chirurgische ingrepen (postoperatieve pijn);
- koorts en pijn na vaccinatie;
- spier- en gewrichtspijn, kneuzingen en verstuikingen;
- spit (rugpijn);

Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij pijnklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o De algemene regels en waarschuwingen bij het gebruik van spierwrijfmiddelen benoemen

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik

*De kandidaat kan voor de indicaties:*

- *koorts en pijn bij griep en verkoudheid;*
- *hoofdpijn (ook: spanningshoofdpijn en middelengeïnduceerde hoofdpijn);*
- *symptomen van) migraine;*
- *kiespijn, (pijn bij het) doorkomen van de eerste tanden;*
- *(acute) keelpijn;*
- *zenuwpijn;*
- *reumatische pijn;*
- *menstruatiepijn;*
- *(pijn bij) artrose;*
- *(milde tot matige) artrose van de knie;*
- *pijn na chirurgische ingrepen (postoperatieve pijn);*
- *koorts en pijn na vaccinatie;*
- *spier- en gewrichtspijn, kneuzingen en verstuikingen;*
- *spit (rugpijn);*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen bij pijnklachten (bijlage 1 en 2)
  - o Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in de UAD-geneesmiddelen bij pijn- en koortsklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o Uiteenzetten wat (over)gevoeligheid voor pijnstillers voor gevolgen heeft voor pijnbestrijding
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)

- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen bij pijn, koorts en griep (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)
  - o Uiteenzetten wat (over)gevoeligheid voor pijnstillers voor gevolgen heeft voor pijnbestrijding

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o De algemene regels en waarschuwingen bij het gebruik van spierwrijfmiddelen benoemen

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen de beschikbare UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van een beschikbaar UAD-geneesmiddel

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

## **Verkoudheidsklachten**

### Passend advies geven

*De kandidaat kan voor de indicaties:*

- *desinfectie (ontsmetten) van de mond-/keelholte;*
- *(allergische) rhinitis (neusslijmvliesontsteking);*
- *bijholteontsteking (sinusitis);*
- *middenoorontsteking;*

- *hooikoorts (pollinose);*
- *verkoudheid, verstopte neus, loopneus;*
- *hoest (droge hoest en productieve hoest)*

Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij verkoudheidsklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik:

*De kandidaat kan voor de indicaties:*

- *desinfectie (ontsmetten) van de mond-/keelholte;*
- *(allergische) rhinitis (neusslijmvliesontsteking);*
- *bijholteontsteking (sinusitis);*
- *middenoorontsteking;*
- *hooikoorts (pollinose);*
- *verkoudheid, verstopte neus, loopneus;*
- *hoest (droge hoest en productieve hoest)*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in UAD-geneesmiddelen bij verkoudheidsklachten zitten (bijlage 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD- geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD- geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD- geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD- geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van UAD- geneesmiddelen (bijlage 1)

Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van een UAD-geneesmiddel

Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

## **Maag- en darmklachten**

### Passend advies geven

*De kandidaat kan voor de indicaties:*

- *brandend maagzuur (zuurbranden), zure oprispingen, hyperaciditeit (teveel zuur in maag en slokdarm);*
- *flatulentie (winderigheid);*
- *opgeblazen gevoel;*
- *misselijkheid (braken, spugen);*

- *obstipatie (verstopping, hardlijvigheid);*
- *(acute) diarree;*
- *worminfecties(aarsmaden, lintwormen);*
- *aambeien*

Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij maag- en darmklachten
- (bijlage 1 en 2)
  - Benoemen welke soorten maagmiddelen er zijn
  - Benoemen welke soorten laxeermiddelen er zijn
  - Benoemen welke soorten aambeimiddelen er zijn
  - Benoemen welke soorten diarreemiddelen er zijn
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *brandend maagzuur (zuurbranden), zure oprispingen, hyperaciditeit (teveel zuur in maag en slokdarm);*
- *flatulentie (winderigheid);*
- *opgeblazen gevoel;*
- *misselijkheid (braken, spugen);*
- *obstipatie (verstopping, hardlijvigheid);*
- *(acute) diarree;*
- *worminfecties(aarsmaden, lintwormen);*
- *aambeien*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - Benoemen welke fytotherapeutische stoffen in UAD-geneesmiddelen bij maag- en darmklachten zitten (bijlage 2)

- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

#### Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

#### Eindterm 14 e

- Benoemen welke verschijnselen kunnen optreden bij een overdosering van UAD-geneesmiddelen (bijlage 1)

#### Eindterm 14 f

- Benoemen welke acties de klant moet ondernemen als sprake is van een overdosering van een UAD-geneesmiddel

#### Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

#### Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

## Huidklachten

### Passend advies geven

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *desinfectie (ontsmetten) van huid en wonden;*
- *koortslip (herpes labialis, koortsuitslag, koortsblaasjes);*
- *schimmelinfectie, zwemmerseczeem (tinea pedis, voetschimmel);*
- *wratten, likdoorns (eksterogen), steenpuist;*
- *(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken;*
- *luieruitslag;*
- *huiduitslag (eczeem, dauwworm), acne;*
- *hoofdluis*

Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn bij huidklachten (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o De basisprincipes van reiniging en ontsmetting van de huid uiteenzetten

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

### Inlichten over gevolgen van gebruik

De kandidaat kan voor de indicaties:

- *desinfectie (ontsmetten) van huid en wonden;*
- *koortslip (herpes labialis, koortsuitslag, koortsblaasjes);*
- *schimmelinfectie, zwemmerseczeem (tinea pedis, voetschimmel);*
- *wratten, likdoorns (eksterogen), steenpuist;*
- *(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken;*
- *luieruitslag;*
- *huiduitslag (eczeem, dauwworm), acne;*
- *hoofdluis*

Eindterm 12



- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen bij huidklachten (bijlage 1 en 2)
  - o Benoemen wat reiniging- en ontsmettingsmiddelen voor de huid zijn (bijlage 1)
  - o Benoemen welke UAD-geneesmiddelen er zijn bij huidklachten (bijlage 1)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

#### Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik tussen UAD-geneesmiddelen met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

### **Overige indicaties**

(kinderziektes, stoppen met roken, nervositeit, reisziekte, noodanticonceptie, rusteloze benen en vaginale schimmelinfecties)

#### Passend advies geven

*De kandidaat kan voor de overige indicaties waaronder valt:*

- *kinderziekten;*

- *nicotinesubstitutie (stoppen met roken);*
- *psychische klachten;*
- *reisziekte;*
- *morningafterpil;*
- *overgangsklachten;*
- *tanden en mond;*
- *vaginale schimmelinfecties;*
- *urine­w­eg­problemen*

Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o Omschrijven wat de belangrijkste aspecten van de noodanticonceptiepil zijn

Eindterm 10 e

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

Inlichten over gevolgen van gebruik

*De kandidaat kan voor de overige indicaties waaronder valt:*

- *kinderziekten;*
- *nicotinesubstitutie (stoppen met roken);*
- *psychische klachten;*
- *reisziekte;*
- *morningafterpil;*
- *overgangsklachten;*
- *tanden en mond;*
- *vaginale schimmelinfecties;*
- *urine­w­eg­problemen*

Eindterm 12

- Benoemen wat de aard is (eigenschappen) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de indicatie is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

- Benoemen wat de te verwachten effecten zijn bij gebruik van beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

#### Eindterm 14 a

- Omschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 b

- Omschrijven wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 c

- Omschrijven wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### Eindterm 14 d

- Omschrijven wat de risico's zijn van combinatiegebruik met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

#### Eindterm 15

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

#### Eindterm 19

- Benoemen in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

## **Homeopathie**

#### Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

#### Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)
- Omschrijven wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 10c

- Benoemen welke groep aandoeningen met name geschikt is voor homeopathische behandeling
- Benoemen welke UAD-geneesmiddelen behoren tot de RVH-homeopathische of RVH-fytotherapeutische geneesmiddelen (zie bijlage 1)

Eindterm 10 d

- Omschrijven wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Omschrijven wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

Eindterm 13

- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

## Bijlage 1

### Producten – 2018

#### Pijn en koorts

- Advil
- Aleve Classic
- Aleve Select
- Alka-Seltzer
- Aspirine 100 en 500
- Aspro 500 Bruis
- Daro hoofdpijnpoeder
- Finimal
- Nurofen
- Nurofen Fastine
- Nurofen voor kinderen
- Panadol
- Panadol Junior
- Panadol Plus
- Panadol Zapp
- Roter APC
- Roter Paracetamol
- Roter Paracetamol Junior
- Roter Paracof
- Sanalgin
- Sarixell
- Saridon
- Sinaspril
- Voltaren K
- Witte Kruis

#### Migraine

- Nurofen Migraine
- Excedrin

#### Griep

- A. Vogel Echinaforce
- Antigrippine
- Aspirine-C
- Citrosan
- Hot Coldrex

#### Kiespijn en pijn bij het doorkomen van eerste tanden

- Dentinox

#### Keelpijn

- Strepfen zuigtablet
- Strepfen keelspray
- Vicks Farinex

#### Menstruatiepijn

- Aleve Feminax
- Nurofen Female

#### Artrose

- Glucosamine Pharma Nord
- Voltaren Emulgel

#### Spier en gewrichtspijn

- A. Vogel Atrosan tabletten
- Roter Harpago

#### Oorpijn

- Otagan

#### Allergische rhinitis

- Allerfre
- Reactine
- Prevalin
- Allergo-COMOD

#### Verkoudheid, verstopte neus, loopneus

- Bisolnasal
- Dampo Verkoudheidsbalsem
- Luuf Verkoudheidsbalsem baby

- Luuf Verkoudheidsbalsem kind
- Otrivin
- Otrivin Duo
- Vicks Sinex
- Vicks Vaporub

#### **Droge hoest**

- Fluitussin
- Natterman Bronchicum Extra Sterk
- Natterman Noscasan
- Roter Noscapect
- Bisolnex

#### **Productieve hoest**

- Mucodyne Adult
- Natterman Bronchicum
- Bisolhelix
- A.Vogel Drosinula

#### **Hoest algemeen**

- Bronchostop hoestdrank
- Bronchostop hoestpastilles

#### **Maagzuur (met flatulentie, opgeblazen gevoel)**

- Losecosan 20 mg
- Pantozol Control
- Nexium Control
- Regla pH kauwtablet
- Rennie Deflatine
- Rennie Suikervrij
- Zantac 75

#### **Maagkrampen**

- Buscopan
- Buscopan zetpillen
- Buscopan zetpillen voor kinderen
- Tempocol

#### **Maagklachten algemeen (dyspepsie)**

- Iberogast

#### **Obstipatie**

- Dulcodruppels
- Dulcolax
- Dulcolax zetpillen 10 mg
- Dulcoperls
- Lactulosesiroop
- Metamucil Suikervrij
- Microlax

#### **Diarree**

- Imodium drank
- Losimed Duo

#### **Aambeien**

- A. Vogel Aesculaforce
- A. Vogel Hamameliszalf
- EpiAnal
- Sperti
- Theranal

#### **Desinfectie**

- Betadine Oplossing
- Betadine Scrub
- Betadine Shampoo
- Betadine Zalf
- Betadine Zalfgaas
- Dettol Med Benzalkoniumchloride
- Dettol Med Chloorxylenol
- Dettol Sterilon

#### **Schimmelinfectie**

- Canesten Skin
- Daktarin
- Daktarin Nagellak
- Lamisil
- Lamisil Once

### Wratten

- Formule W
- Duofilm

### (jeuk en pijn bij) Insectenbeten en –steken

- Nestosyl

### Huidklachten

- Daro Trekzalf
- Daro Zinkzalf

### Hoofdhuidklachten

- Selsun

### Hoofdluis

- Loxazol
- Prioderm lotion
- XT Luis

### Nicotinesubstitutie

- Nicorette
- Nicotinell
- NiQuitin

### Nervositeit

- Valdispert 45 mg
- Valdispert 450 mg

### Reisziekte

- Primatour
- Suprimal

### Noodanticonceptie

- NorLevo
- EllaOne

### Tandcariës

- Corsodyl mondspoeling
- Corsodyl tandgel
- Hextril
- Pyralvex

### Vaginale schimmelinfecties

- Canesten Gyno

### Urineweg problemen

- Roter Uva-Ursi
- Granufink Femina
- Granufink Prosta
- Granufink Prosta Forte

### Homeopathie

- A. Vogel Alchemilla complex
- A. Vogel Arnica D6
- A. Vogel Avena sativa complex
- A. Vogel Belladonna D4
- A. Vogel Famosan
- A. Vogel Nux vomica D4
- A. Vogel Passiflora complex
- A. Vogel Pollinosan
- A. Vogel Thuja D6
- Oscillococcinum
- Traumeel S
- VSM Arnica Montana D6
- VSM Nisyleen
- VSM Okugest
- VSM Tonsiotreen
- VSM Tussistin
- VSM Kind Chamodent
- VSM Kind Cinababy
- VSM Kind Kindigest
- VSM Kind Kindival
- VSM Kind Nisykind tabletten
- VSM Kind Tussikind siroop

### **Fytotherapie**

- A. Vogel Dormeasan
- A. Vogel Drosera complex
- A. Vogel Geriaforce
- A. Vogel Solidago complex
- A. Vogel Thuja ø
- A. Vogel Valeriaan ø = D1
- A. Vogel crème Bioforce



## Bijlage 2

### Werkzame stoffen – 2018

#### Pijn en koorts

- Acetylsalicylzuur
- Coffeïne
- Diclofenac kalium
- Ibuprofen
- Naproxennatrium
- Paracetamol
- Propyfenazon

#### Migraine

- Acetylsalicylzuur
- Cafeïne
- Ibuprofen
- Paracetamol

#### Griep

- Acetylsalicylzuur
- Ascorbinezuur
- Coffeïne
- Echinacea purpurea
- Paracetamol

#### Kiespijn en pijn bij het doorkomen van eerste tanden

- Lidocaïnehydrochloride

#### Keelpijn

- Ambroxolhydrochloride
- Amylmetacresol
- Benzydaminehydrochloride
- Chloorhexidine
- Dequaliniumdichloride
- Dichloorbenzylalcohol
- Flurbiprofen
- Lidocaïnehydrochloride
- Propylparahydroxybenzoaat

#### Menstruatiepijn

- Ibuprofen
- Naproxennatrium

#### Artrose

- Calciumcarbonaat
- Diclofenac diethylamine
- Glucosamine

#### Spier en gewrichtspijn

- Benzydaminehydrochloride
- Harpagophytum radix

#### Oorpijn

- Lidocaïnehydrochloride

#### Allergische rhinitis

- Cetirizinehydrochloride
- Dinatriumcromoglicaat
- Loratadine

#### Verkoudheid, verstopte neus, loopneus

- Bergdenolie
- Dennennaaldenolie
- Eucalyptusolie
- Ipratropiumbromide
- Kamfer
- Levomenthol
- Majoranaolie
- Oxymetazolinehydrochloride
- Terpentijnolie
- Thymol
- Tramazolinehydrochloride
- Xylometazolinehydrochloride
- Zoutoplossing 0,9% en 2,2%

### **Droge hoest**

- Codeïnefosfaat
- Noscapinehydrochloride

### **Productieve hoest**

- Acetylcysteïne
- Broomhexinehydrochloride
- Carbocysteïne
- Hedera helix
- Drosera rotundifolia
- Dactylopius coccus
- Picea excelsa
- Inula helenium
- Cephaelis ipecacuanha

### **Hoest algemeen**

- Althaeae
- Hederae helices extractum
- Thyme

### **Maagzuur (met flatulentie, opgeblazen gevoel)**

- Alginezuur
- Aluminiumhydroxide
- Aluminiumoxide
- Bismuthsubnitraat
- Calciumcarbonaat
- Famotidine
- Kaliumwaterstofcarbonaat
- Magnesiumcarbonaat
- Magnesiumhydroxide
- Natriumalginaat
- Natriumwaterstofcarbonaat
- Omeprazol
- Esomeprazol
- Pantoprazol natrium
- Ranitidinehydrochloride
- Simethicon

### **Maagkrampen**

- Butylscopolaminebromide
- Pepermuntolie

### **Maagklachten algemeen (dyspepsie)**

- Angelica radix
- Carvi fructus
- Chelidonii herba
- Iberis amara
- Liquiritiae radix
- Matricariae chamomillae flos
- Melissa folium
- Menthae piperitae folium
- Silybi mariani fructus

### **Obstipatie**

- Bisacodyl
- Dexpanthenol
- Lactulose
- Natriumlaurylsulfaat
- Natriumpicosulfaat
- Psylliumvezels
- Senna fructus
- Sorbitol

### **Diarree**

- Glucose
- Kaliumchloride
- Kool, geactiveerd
- Loperamidehydrochloride
- Natriumchloride
- Natriumwaterstofcitraat
- Simeticon

### **Wormpjes (aarsmaden)**

- Mebendazol

### **Aambeien**

- Aesculi hippocastani extractum
- Bismuthsubnitraat
- Echinacea
- Hyperici floris
- Iecoris negraprionis oleum
- Lidocaïne
- Saccharomycetis vivi extractum

- Natriumoleaat
- Polidocanol
- Zinkoxide

#### **Acne**

- Benzoylperoxide
- Miconazolnitraat

#### **Desinfectie**

- Benzalkoniumchloride
- Chloorhexidinedigluconaat
- Chloorxylenol
- Povidon jodium

#### **Koortslip**

- Aciclovir
- Penciclovir

#### **Schimmelinfectie**

- Clotrimazol
- Miconazolnitraat
- Terbinafinehydrochloride

#### **Wratten**

- Melkzuur
- Salicylzuur

#### **(jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken**

- Pramocaïne
- Tripelennaminehydrochloride
- Zinkoxide

#### **Huidklachten**

- Sulfobituminoseammonium
- Zinkoxide

#### **Hoofdhuidklachten**

- Seleniumsulfide

#### **Hoofdluis**

- Dimeticon
- Malation
- Permetrine

#### **Nicotinesubstitutie**

- Nicotine

#### **Nervositeit**

- Valerianae extractum

#### **Reisziekte**

- Chloorcyclizinehydrochloride
- Cinnarizine
- Meclozine dihydrochloride

#### **Noodanticonceptie**

- Levonorgestrel
- Ulipristal acetaat

#### **Tandcariës**

- Chloorhexidinedigluconaat
- Hexetidine
- Natriumfluoride
- Rhei extractum
- Salicylzuur

#### **Vaginale schimmelinfecties**

- Clotrimazol

#### **Urinewegproblemen**

- Arctostaphylos uvaursi folium (berendruifblad)
- Pompoenpitextract
- Pompoenpitolie

### Homeopathie

- Aconitum napellus
- Alchemilla vulgaris
- Ammi visnaga
- Antimonium sulfuratum auratum
- Arnica montana
- Arsenicum album
- Avena sativa
- Belladonna
- Bryonia alba
- Bryonia cretica
- Calendula officinalis
- Carbo vegetabilis
- Cardiospermum halicacabum
- Chamomilla
- Cimicifuga racemose
- Cinnabaris
- Drosera rotundifolia
- Echinacea angustifolia
- Eucalyptus globulus
- Eupatorium perfoliatum
- Guajacum officinale
- Hepar sulfur
- Hypericum perforatum
- Ignatia amara
- Ipecacuanha
- Lachesis mutus
- Luffa operculata
- Kalium bichromicum
- Melissa officinalis
- Mercurius iodatus ruber
- Nux vomica
- Okoubaka aubrevillei
- Panax ginseng
- Passiflora incarnata
- Phosphorus
- Pulsatilla pratensis
- Sepia officinalis
- Silicea
- Symphytum officinalis
- Thuja occidentalis
- Valeriana officinalis

### Fytotherapie

- Aesculi hippocastani extractum
- Arnica montana
- Avena sativa
- Calendula officinalis
- Drosera rotundifolia
- Echinacea purpurea
- Ginkgo biloba
- Hamamelidis extract
- Hyperici floris
- Ipecacuanha
- Melissa officinalis
- Passiflora incarnata
- Solidago virgaurea
- Thuja occidentale
- Thymus vulgaris
- Valeriana officinalis
- Viola tricolor

## Bijlage 3

### Terminologie – 2018

Aambeien	Beroerte
Aanbevolen dosering	Bètablokker
Aandoening	Bewegingsziekte
Accidentele overdosering	Bewusteloosheid
ACE-remmers	Bewustzijn
Acute middelen	Bijwerking
Acuut	Bloedbeeld
Adolescent	Bloedcirculatie
Advies	Bloeddruk
Aften	Bloedingstijd
Afweersysteem	Bloedneus
Alcoholisme	Bloedplaatjes
Allergische reactie	Bloedstolling
Allergische rhinitis	Bloeduitstorting
Allopathisch geneesmiddel	Bloedverduunners
Anamnese	Braken
Antagonist	Breed werkingsgebied
Anticonceptie	Bronchiaal
Antibioticum	Bruistablet
Anticoagulantia	Buitenbaarmoederlijke zwangerschap
Antidepressiva	Bypass
Antihistaminica	
Antistollingsmiddelen	Candida albicans
Antiviraal	CBG
Anus	Cervixkapje
Applicator	Centesimaal
Artritis	Chirurgische ingreep
Artrose	Chronische aandoening
Ascorbinezuur	Chronische middelen
Aspartaam	Coïtus interruptus
Aspirator	Coma
Astma	Combinatiegeneesmiddel
Auto-immuunziekte	Communicatieleer
AV	Condoom
	Constitutiemiddel
Baarmoeder	Contra-indicatie
Bacteriële infectie	Coördinatieproblemen
Bacteriën	Corticosteroïde
Beginverergering	Criteria
Benauwdheid	
Benzoaat	Dagdosering

Decimaal	Gestandaardiseerd plantenextract
Desinfectans	Gesuperviseerd
Desoriëntatie	Giften
Diabetici	Glaucoom
Diuretica	Glucose
Doktersvoorschrift	Gluten
Doseringsschema	
Dosis	H2 antagonist
Dragee	Haarvat
Droge hoest	Hallucinatie
Duizeligheid	Hartfalen
Dynamiseren	Hartritmestoornissen
Dyspepsie	Hemolytische anemie
	Heparine
Eczeem	Herpes labialis
Effecten	Herpes simplex
Effectieve dosering	Hersenbloeding
Eierstokken	Histamine
Eksterogen	Hoestonderdrukkend
Emulgel	Hoestprikkel
Emulsie	Homeopathica
Enzym	Homeopathisch geneesmiddel
Evenwichtsstoornissen	Hooikoorts
Exantheem	Hormonaal
Extract	Huiduitslag
	Hulpstof
Farmaceutisch	Hyperaciditeit
Farmacokinetische	Hypertensie
Fenylaline	Hyperventilatie
Fenylketonurie	Hypofyse
Filmomhulde tablet	
Funciestoornis	Indicatie
Fysisch	Infectie
Fytotherapeutica	Inhaleren
Fytotherapeutisch geneesmiddel	Innesteling
	Insufficiëntie
Galactosemie	Insuline
Galbulten	Interactie
Gastro oesofageale reflux	Irreversibele levernecrose
Geelzucht	
Geneesmiddel	Kaliumverlies
Geneesmiddelbeeld	Kassacheck
Geneeswijze	Klassieke homeopathie
Geslachtsgemeenschap	Klinische homeopathie
Geslachtsorganen	Klinisch bewijs

Klyasma	Oedeem
Koortslip	Ontsmetten
Kortademigheid	Ontsteking
Kruidengeneesmiddel	Ontstekingsremmend
Kruidentincturen	Omhulde tablet
	Oogboldruk
Lactatie	Oorsuizen
Lactose intolerantie	Ophoesten
Lapp-lactase deficiëntie	Orale conceptiva
Liquid capsule	Oropharyngeaal
Lokaal	ORS
Longblaasjes	Overdosering
Longemfyseem	Overgang
Loopneus	Overgevoeligheidsreactie
Luieruitslag	
Luizen	Parasieten
	Patiëntenbijsluiter
Maagsapresistent	Penis
Maagzweer	Pentoxifylline
MAO-remmers	Perforatie van maag of darm
Medisch hulpmiddel	Pessarium
Mee-eter	Platluis
Megacolon	Pollinose
Melksuiker	Postoperatief
Methotrexaat	Potentiëren
Micro-organisme	Prikkelhoest
Miskraam	Prostaat
Misselijkheid	Pruritus
Modaliteit	Psoriasis
Moedervlek	Puisten
Mondzweren	
Motiliteit	Recept
Mucolytica	Rectaal
Mucoviscidose	Remmende factoren
	Resistentie
Natriumdieet	Retard werking
Netelroos	Rhinitis sicca
Neten	Risicogroep
Neuspoliep	RVG
Nicotinesubstitutie	RVH
Noodanticonceptiepil	
NSAID	Sacharose
	Sachet
Occlusief verband	Salicylaten
	Schaamluis

Schildklier	Uitdroging
Schimmeldodend	Uni-dosis
Schimmelinfectie	UR
Schurft	Urinelozing
Sinusitis	Urinewegen
Slijmvlies	Urticaria
Smaakstoornissen	
Smelttablet	Vaatverwijderend
Spasmen	Vaccinatie
Spijsverteringsproblemen	Vaginale afscheiding
Spiraaltje	Vastzittende hoest
Stofwisselingsprocessen	Veneuze insufficiëntie
Stoornis	Vergeten dosis
Stuipen	Vergiftigingen
Sucrose	Verwardheid
Sufheid	Virus
Suspensie	Vluchtige oliën
Symptomatische behandeling	Vomeren
Symptomen	Voorbehoedsmiddel
	Voorhoofdholte
Taaitslijmziekte	
Talg	Waarschuwing
Tandbederf	Wazig zien
Tandglazuur	Weerstand
Tandplak	Werkzame stof
Tandvleesontsteking	Wetenschappelijk
Ter handstellen	Wijnvlek
Tinea pedis	Wisselwerking
Therapeutische indicatie	Witte bloedlichaampjes
Toedieningsfrequentie	Witte vloed
Topicaal	Wratten
Torpedovormig	
Toxisch	Zelfzorg
Traditioneel gebruik	Zetpil
Transpireren	Ziekte van Crohn
Trombose	Ziektebeeld
Tuberculose	Ziektekiemdodend
	Zwemmerseczeem
UA	
UAD	



#### **Bijlage 4: Meest risicovolle geneesmiddelen(groepen) met bijbehorende risicowaarschuwingen en adviezen:**

<b>Geneesmiddelengroep</b>	<b>Mondelinge risicowaarschuwing als (onderdeel van de) kassacheck</b>	<b>Advies door de (assistent)drogist</b>
<b>NSAID's</b> -acetylsalicylzuur -diclofenac -ibuprofen -naproxen	Dit geneesmiddel kan maagklachten en andere klachten veroorzaken, zeker bij veelvuldig gebruik.  De (assistent)drogist kan u hierover informeren.	Risico hangt onder andere af van leeftijd klant, overige medicatie die klant gebruikt en of de klant gevoelig is voor NSAID's.  Er zijn alternatieven: In veel gevallen is paracetamol een goed alternatief.
<b>Middelen tegen diarree</b> - loperamide	Zorg dat u bij gebruik van dit geneesmiddel voldoende vocht inneemt, bijvoorbeeld ORS.	U loopt het risico op uitdroging doordat het vocht met de diarree uit het lichaam verdwijnt. ORS bevat zouten en suikers die uw lichaam nodig heeft bij diarree.
<b>Laxeermiddelen</b> - bisacodyl - senna - natriumpicosulfaat	Dit geneesmiddel geeft risico op uitdroging. Ook bestaat het gevaar dat dat de darmen niet meer vanzelf werken ('luie' darmen).	Deze geneesmiddelen innemen met veel water of met ORS.  Gebruik laxeermiddelen niet langer dan drie dagen achter elkaar. Werkt het niet voldoende binnen drie dagen? Raadpleeg dan uw arts.
<b>Sint-Janskruid (Hypericum perforatum)</b>	Dit middel kan invloed hebben op de werking van andere geneesmiddelen. Lees de bijsluiters of overleg zo nodig met uw arts of apotheker.	Kruiden, zoals Sint-janskruid, worden ten onrechte als onschuldig beschouwd.  Het is belangrijk te weten bij welke geneesmiddelen u Sint-Janskruid niet moet gebruiken. Ook niet bij de anticonceptiepil, dat is namelijk ook een geneesmiddel.

<p><b>Paracetamol</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- paracetamol</li> <li>- hot coldrex e.a.</li> </ul>	<p>Houd u aan de maximale dagdosering. Bij overschrijding hiervan kan lever- en nierbeschadiging ontstaan.</p>	<p>Neem bij chronisch gebruik (langer dan 1 maand) maximaal 5 tabletten per dag, bij incidenteel gebruik maximaal 8 tabletten per dag.</p> <p>Bij gebruik van meer dan 15 pijnstillers per maand kan pijnstillerafhankelijke hoofdpijn ontstaan.</p>
<p><b>Miconazol</b></p>	<p>Dit geneesmiddel niet gebruiken als u bij de trombosedienst onder controle staat.</p>	<p>Miconazol kan de bloedstolling ontregelen.</p>
<p><b>Middelen tegen verstopte neus</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- xylometazoline</li> <li>- oxymetazoline</li> <li>- tramazoline (bisolnasal)</li> </ul>	<p>Als u deze geneesmiddelen te lang achter elkaar gebruikt, wordt uw klacht juist erger.</p>	<p>Deze geneesmiddelen maximaal 7 dagen achter elkaar gebruiken, daarna één maand niet.</p>
<p><b>Hoestmiddelen</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- noscapine</li> <li>- codeïne</li> </ul>	<p>Deze geneesmiddelen beïnvloeden uw reactievermogen. Kijk vooral uit met autorijden of het bedienen van machines.</p> <p>Noscapine niet gebruiken als u bij de trombosedienst onder controle staat.</p>	<p>Codeïne en noscapine werken alleen tegen droge kriebel- of prikkelhoest.</p> <p>Noscapine niet bij een slijmhoest gebruiken. Het onderdrukt de hoestprikkel die nodig is om het slijm op te hoesten.</p> <p>Noscapine kan de bloedstolling ontregelen.</p>
<p><b>Middelen bij maagklachten</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- omeprazol</li> <li>- pantoprazol</li> </ul>	<p>Als u deze middelen lang achter elkaar gebruikt, kunt u last krijgen van bijwerkingen,</p>	<p>Omeprazol en pantoprazol kunnen bij langdurig gebruik bijwerkingen geven, zoals botontkalking, darminfecties en nierfalen.</p> <p>Gebruik indien mogelijk liever lichtere middelen, of overleg met een arts.</p>
<p><b>Extra*</b></p>	<p>* Vanwege privacy redenen is een mondelinge risicowaarschuwing bij de morning-afterpil soms lastig te geven. De risicowaarschuwing kan als alternatief in een flyer meegegeven worden bij de verkoop van de morning-afterpil.</p>	
<p><b>Morning-afterpil</b></p>	<p>Als u dit geneesmiddel niet tijdig na onbeschermd geslachtsgemeenschap gebruikt, dan bestaat het risico op</p>	<p>De maximale termijn waarbinnen u - na onbeschermd</p>

	ongewenste zwangerschap en verstoring van de menstruatiecyclus.	geslachtsgemeenschap - deze pil moet innemen bedraagt maximaal drie dagen (72 uur) bij levonorgestrel of vijf dagen (120 uur) bij ulipristal. Verwijs de klant naar de huisarts indien deze termijn is overschreden.
<b>Morning-afterpil met levonorgestrel</b>	Dit geneesmiddel werkt minder goed bij gelijktijdig gebruik van bepaalde andere geneesmiddelen.	<p>Gebruikt u geneesmiddelen tegen epilepsie, tuberculose of HIV, of kruidenmiddelen met Sint-janskruid? Neem dan het dubbele aantal tabletten en overleg zo spoedig mogelijk na inname van de morning-afterpil met uw arts.</p> <p>Als u een andere behandeling wilt, laat dan binnen 5 dagen een koperspiraaltje ('morning-afterspiraaltje') plaatsen door een arts.</p>
<b>Morning-afterpil met ulipristal</b>	Dit geneesmiddel werkt minder goed bij gelijktijdig gebruik van bepaalde andere geneesmiddelen.	<p>Gebruikt u geneesmiddelen tegen maagklachten, gebruik dan een andere morning-afterpil of zorg dat u de morning-afterpil en de maagtabletten niet gelijktijdig inneemt: neem ulipristal in ten minste 12 uur NA een maagtablet zoals ranitidine. Neem ulipristal in ten minste 24 uur NA een maagtablet zoals pantoprazol of omeprazol. Neem ulipristal in ten minste 2 uur VOOR of 4 uur NA een maagtablet zoals Antagel, Gaviscon en Rennie. Overleg bij twijfel met een arts of apotheker.</p> <p>Gebruikt u geneesmiddelen tegen epilepsie, tuberculose of HIV, of kruidenmiddelen met Sint-janskruid? Gebruik dan een</p>

		andere morning- afterpil.
--	--	---------------------------