

# Pharmacon Exameneisen

## Assistent-drogist voor

### Apothekersassistent – 2025

#### Wet – en regelgeving (Basiskennis)

*De kandidaat kan:*

##### **Eindterm 1**

- De wettelijke adviesplicht voor UAD-geneesmiddelen omschrijven
- De wettelijke adviesfunctie van de (assistent -) drogist omschrijven
- De inhoud van de wettelijke bepalingen uit de Geneesmiddelenwet (art 1, lid 1 en art 62 ) omschrijven
- Omschrijven welke wettelijke regels gelden bij het ter handstellen van UAD-geneesmiddelen
- Benoemen welke wettelijke regels gelden voor UAD-geneesmiddelen die behoren tot de homeopathica of fytotherapeutica

##### **Eindterm 2**

- Uitleggen wat de termen UR, UA, UAD en AV betekenen
- Uitleggen wanneer een product een geneesmiddel is
  - o Benoemen wat verschillen en overeenkomsten zijn tussen fytotherapie, homeopathie en reguliere geneeskunde
- Uitleggen wat zelfzorg inhoudt
- Uitleggen wat het doel van zelfzorgvoorlichting is
- Uitleggen welke rol UAD-geneesmiddelen binnen de zelfzorg spelen

##### **Eindterm 5**

- Omschrijven wat de kenmerken van voorlichting zijn
- Omschrijven wat de kenmerken van advies zijn
- Omschrijven wat de kenmerken van reclame zijn
- Benoemen wat de verschillen zijn tussen voorlichting, advies en reclame

#### Zelfzorgvoorlichting en communicatie

*De kandidaat kan:*

##### **Eindterm 17**

- Uitleggen wat de functie en het belang van de kassacheck is

- Aantonen in welke situatie een klant behoefte heeft aan advies

### **Eindterm 18**

- Beredeneren in welke situaties de klant moet worden ingelicht over de risico's en gevolgen van gebruik van UAD-geneesmiddelen en veel verkochte zelfzorgmiddelen (bijlage 4 en 5)
- Benoem de belangrijkste zelfzorggeneesmiddelen en werkzame stoffen met een groot risico op verkeerd gebruik of ernstige bijwerkingen of niet geschikt voor bepaalde groepen gebruikers en de bijbehorende verplichte ongevroegde risicowaarschuwing (bijlage 4 en bijlage 5)

## Adviseren en informeren over UAD-geneesmiddelen per indicatiegebied

### **Huidindicaties:**

- *Acné*
- *Huiduitslag*
- *Smetplekken*
- *Eczeem*

*De kandidaat kan:*

### **Eindterm 7**

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

### **Eindterm 8**

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

### **Eindterm 9**

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

### **Eindterm 10 a**

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
  - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

### **Eindterm 10 b**

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn (bijlage 1 en 2)

- Uitleggen wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

#### **Eindterm 10 d**

- Benoemen wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Toelichten wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### **Eindterm 10 e**

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

#### **Eindterm 13**

- Aantonen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Aantonen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Aantonen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

#### **Eindterm 14 a**

- Beschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### **Eindterm 14 b**

- Benoemen wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

#### **Eindterm 14 c**

- Aantonen wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

#### **Eindterm 14 d**

- Uitleggen wat de risico's zijn van combinatiegebruik van UAD-geneesmiddelen met andere zelfzorggeneesmiddelen, de meest gebruikte receptgeneesmiddelen of gezondheidsproducten

## Adviseren en informeren over UAD-geneesmiddelen per indicatiegebied

### Overige indicaties:

- *Overgangsklachten*
- *Urinewegproblemen*
- *Psychische klachten*

De kandidaat kan:

#### Eindterm 7

- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een specifiek UAD-geneesmiddel
- Benoemen wat een passend advies is, ingeval van een vraag naar een product met een specifieke werkzame stof

#### Eindterm 8

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

#### Eindterm 9

- De meest belangrijke indicaties benoemen waarvoor UAD-geneesmiddelen worden verkocht (zie bijlage 1)

#### Eindterm 10 a

- De meest voorkomende klantvragen en gezondheidsklachten benoemen
  - o Benoemen wat de belangrijkste oorzaken en symptomen daarvan zijn

#### Eindterm 10 b

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn (bijlage 1 en 2)
- Uitleggen wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

#### Eindterm 10 d

- Benoemen wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Toelichten wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
  - o Uitleggen wat de belangrijkste aspecten van de noodanticonceptiepil zijn

**Eindterm 10 e**

- Benoemen wat de eerste en tweede keus UAD-geneesmiddelen zijn

**Eindterm 13**

- Aantonen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Aantonen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Aantonen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

**Eindterm 14 a**

- Beschrijven wat de relevante contra-indicaties zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

**Eindterm 14 b**

- Benoemen wat de relevante bijwerkingen zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (zeer vaak (1:100) en vaak (1:1000)) (bijlage 1 en 2)

**Eindterm 14 c**

- Aantonen wat de aanwijzingen voor onjuist gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

**Eindterm 14 d**

- Uitleggen wat de risico's zijn van combinatiegebruik met andere UAD-geneesmiddelen of gezondheidsproducten

**Eindterm 15**

- Benoemen in welke situatie een klant wordt geadviseerd naar de huisarts te gaan

**Eindterm 19**

- Toelichten in welke situaties de klant risico loopt op gezondheidsschade

# Homeopathie en fytotherapie

*De kandidaat kan:*

## **Eindterm 8**

- Benoemen wat een passend advies is over het gebruik van een UAD-geneesmiddel naar aanleiding van een gezondheidsvraag of een vraag over een kwaal of aandoening

## **Eindterm 10 b**

- Benoemen wat de beschikbare UAD-geneesmiddelen zijn (bijlage 1 en 2)
- Uitleggen wat de werking is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Benoemen wat de werkzame stof is (of werkzame stoffen zijn) van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 2)

## **Eindterm 10c**

- De essentie van de homeopathie samenvatten
- De basisprincipes van de homeopathie toelichten
  - o Op hoofdlijnen uitleggen hoe homeopathica werken
  - o Toelichten aan welke eisen de toediening moet voldoen
  - o Uitleggen wat een homeopatisch simplex is
  - o Uitleggen wat een homeopatisch complex is
- Toelichten welke specifieke risico's kunnen gelden voor homeopathica
- Toelichten welke groep aandoeningen met name geschikt is voor homeopathische behandeling
- Herkennen of het een homeopatisch of fytotherapeutisch geregistreerd geneesmiddel betreft.

## **Eindterm 10 d**

- Benoemen wat de juiste dosering is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Toelichten wat de juiste wijze van gebruik is van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)

## **Eindterm 13**

- Aantonen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen (bijlage 1 en 2)
- Aantonen wat de risico's bij het gebruik zijn van de beschikbare UAD-geneesmiddelen als de klant behoort tot een van de risicogroepen (bijlage 1 en 2)
- Aantonen welke groepen mensen meer risico lopen bij het gebruiken van UAD-geneesmiddelen (kinderen, ouderen, zwangere vrouwen, vrouwen die zwanger

willen worden of vrouwen die borstvoeding geven, klanten met een ernstige orgaanfunctiestoornis (m.n. lever en nieren), klanten met een aandoening als diabetes en een hart- en vaatziekte, klanten die de Nederlandse taal niet machtig zijn, bestuurders van voertuigen en bedieners van machines)

## Bijlage 1

### Producten

#### Schimmelinfectie

- Canesten Skin
- Daktarin
- Daktarin Nagellak
- Lamisil spray
- Myk-1

#### Huidklachten

- Daro Trekzalf
- Daro Zinkzalf
- Loxazol crème

#### (jeuk en pijn bij) Insectenbeten en - steken

- Nestosyl

#### Jet-lag

- Davitamon melatonine
- Melatonine Pharma Nord
- Shiepz melatonine
- Valdispert Melatonine

#### Nervositeit

- Valdispert 45 mg
- Valdispert 450 mg

#### Urinewegproblemen

- A.Vogel ProstaforceMed

#### Homeopathie

- A. Vogel Arnica D6
- A. Vogel Aesculaforce druppels
- A. Vogel Pollinosan tabletten 200 stuks
- HEEL Diarheel
- HEEL Gastricumeel
- HEEL Oteel
- HEEL Traumeel S
- VSM Arnica Montana D6
- VSM Nisyleen
- VSM Okugest
- VSM Tonsiotreen
- VSM Kind Chamodent
- VSM Kind Cinababy
- VSM Kind Kindival
- VSM Kind Nisykind tabletten
- VSM Kind Tussikind siroop suikervrij
- Oscillococcinum
- Homeovox
- Coryzalia
- Sédatif PC
- Urtizon Complex-korrels

#### Fytotherapie

- A.Vogel Atrosan tabletten
- A. Vogel Aesculaforce tabletten
- A. Vogel Boldocynara tabletten
- A. Vogel Echinaforce druppels
- A. Vogel Linoforce
- A. Vogel ProstaforceMed
- VSM Dormiplant Valeriaan



## Bijlage 2

### Werkzame stoffen

#### Acne

- Benzoylperoxide
- Miconazolnitraat

#### Schimmelinfectie

- Clotrimazol
- Miconazolnitraat
- Sulconazol
- Terbinafinehydrochloride

#### (jeuk en pijn bij) insectenbeten en –steken

- Pramocaine
- Tripelennaminehydrochloride
- Zinkoxide

#### Huidklachten

- Permetrine
- Sulfobituminose-ammonium
- Zinkoxide

#### Jet-lag

- Melatonine

#### Nervositeit

- Valeriana extractum

#### Urinewegproblemen

- Sabal serrulata-extract

#### Homeopathie

- Aesculus hippocastanum
- Aconitum napellus
- Allium cepa
- Ammi visnaga
- Anas barbarariae
- Antimonium sulfuratum auratum
- Apis mellifica
- Arnica montana
- Aerialia racemosa
- Arsenicum album
- Belladonna
- Bellis perennis
- Bryonia alba
- Bryonia cretica
- Calendula officinalis
- Carbo vegetabilis
- Cardiospermum halicacabum
- Chamomilla
- Croton tiglium
- Echinacea angustifolia
- Echinacea purpurea
- Eucalyptus globulus
- Ferrum phosphoricum
- Hamamelis virginiana
- Hedera helix
- Histaminium muriaticum
- Ipecacuanha
- Ledum palustre
- Luffa operculata
- Magnesium carbonicum
- Magnesium muriaticum
- Nux vomica
- Phosphorus
- Podophyllum peltatum
- Pulsatilla pratensis
- Symphytum officinalis
- Zincum valerianicum

#### Fytotherapie

- Aesculus hippocastanum

- *Cassia angustifolia*
- *Cyanara*
- *Echinacea*
- *Harpagophytum*
- *Linum usitatissimum*
- *Rhamnus frangula*
- *Sabal serulata*
- *Silybum*
- *Symphytum x uplandicum*  
(Bastaardsmeerwortel)
- *Taraxacum*
- *Valeriana officinalis*

## Bijlage 3

### **Terminologie**

#### **Begrippen homeopathie en fytotherapie**

Acute middelen

Allopathisch geneesmiddel

Anamnese

Beginverergering

Centesimaal

Chronische middelen

Constitutiemiddel

Decimaal

Dynamiseren

Klassieke homeopathie

Klinische homeopathie

Modaliteit

Potentiëren

Remmende factoren

Ziektebeeld

Bijlage 4: **Meest risicovolle geneesmiddelen(groepen) met bijbehorende risicowaarschuwingen en adviezen:**

Geneesmiddelengroep	Mondelinge risicowaarschuwing als (onderdeel van de) kassacheck	Advies door de (assistent)drogist
<b>Middelen tegen verstopte neus</b> - xylometazoline - oxymetazoline - tramazoline	Het is niet verstandig dit geneesmiddel langer dan 7 dagen te gebruiken, want dan beschadigt het slijmvlies. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen.	Deze geneesmiddelen maximaal 7 dagen achter elkaar gebruiken, daarna 1 maand niet.
<b>Hoestprikkeldepende middelen</b> - noscapine - codeïne	Dit geneesmiddel kan de reactiesnelheid verminderen, en daarom gevaarlijk zijn bij autorijden en bij gebruik van machines. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen.	Codeïne en noscapine werken alleen tegen droge kriebel- of prikkelhoest.  Codeïne en noscapine niet bij een slijmhoest gebruiken. Beide middelen onderdrukken de hoestprikkel, terwijl die prikkel bij een slijmhoest juist nodig is om het slijm op te hoesten.  Noscapine kan de bloedstolling ontregelen.
<b>Miconazol</b> - Daktarin, - AcneCare - Miconazol	Dit geneesmiddel kunt u niet samen met bepaalde bloedverduuners gebruiken. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen.	Miconazol kan de bloedstolling ontregelen.
<b>NSAID's (oraal gebruik)</b> - acetylsalicylzuur - carbasalaat - diclofenac - ibuprofen  - naproxen - flurbiprofen - combinatiemiddelen paracetamol <u>met</u> acetylsalicylzuur en/of propyfenazon	Dit geneesmiddel kan maagklachten veroorzaken, vooral bij lang gebruik. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen.	Risico hangt onder andere af van leeftijd klant, overige medicatie die klant gebruikt, andere ziektes die de klant heeft en of de klant gevoelig is voor NSAID's.  Er zijn alternatieven: In veel gevallen is paracetamol een goed alternatief.
<b>Middelen tegen diarree</b> - loperamide	Er is risico op uitdroging. Het is belangrijk om 2 liter water per dag te drinken. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen.	U loopt het risico op uitdroging, doordat het vocht met de diarree uit het lichaam verdwijnt. ORS bevat zouten en suikers die uw lichaam nodig heeft bij

		diarree.
<b>Laxeermiddelen</b> - bisacodyl - senna	Gebruik dit geneesmiddel niet langer dan 3 dagen, want dat geeft risico op luie darmen en uitdroging. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen.	Deze geneesmiddelen innemen met veel vocht.  Gebruik laxeermiddelen niet langer dan 3 dagen achter elkaar. Werkt het niet voldoende binnen 3 dagen? Raadpleeg dan uw arts.
<b>Sint-Janskruid (Hypericum perforatum)</b>	Gebruik van dit middel kan niet altijd samen met andere geneesmiddelen of met de anticonceptiepil. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen.	Kruiden, zoals Sint-janskruid, worden vaak ten onrechte als onschuldig beschouwd.  Het is belangrijk te weten bij welke geneesmiddelen u Sint-janskruid niet moet gebruiken. Ook niet bij de anticonceptiepil, dat is namelijk een geneesmiddel.
<b>Paracetamol</b> - paracetamol - paracetamol combinatiepreparaten <u>zonder</u> NSAID	Het is belangrijk om niet te veel te gebruiken, want dan kan dit geneesmiddel lever- en nierklachten geven. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen.	Neem bij chronisch gebruik (langer dan 1 maand) maximaal 5 tabletten per dag, bij incidenteel gebruik maximaal 6 tabletten per dag. Bij gebruik van pijnstillers gedurende meer dan 15 dagen per maand kan pijnstillerafhankelijke hoofdpijn ontstaan.
<b>Middelen bij maagklachten</b> - esomeprazol - omeprazol - pantoprazol	Dit geneesmiddel geeft risico op bijwerkingen bij lang gebruik. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen.	Omeprazol en pantoprazol kunnen bij langdurig gebruik bijwerkingen geven, zoals botontkalking, darminfecties en nierfalen.  Gebruik indien mogelijk liever lichtere middelen, of overleg met een arts.  Deze middelen kunnen de bloedstolling ontregelen.

<p><b>Morning-afterpil met levonorgestrel</b></p>	<p>I.v.m. privacy-redenen wordt bij dit middel geen mondelinge risicowaarschuwing gegeven.</p>	<p>Als u dit geneesmiddel niet tijdig (binnen 72 uur) na onbeschermd geslachtsgemeenschap gebruikt, dan bestaat het risico op ongewenste zwangerschap en verstoring van de menstruatiecyclus.</p> <p>Niet gebruiken zonder overleg met een arts als u ook medicijnen tegen epilepsie, tuberculose of hiv, of sint-janskruid of ciclosporine gebruikt.</p>
<p><b>Morning-afterpil met ulipristal</b></p>	<p>I.v.m. privacy-redenen wordt bij dit middel geen mondelinge risicowaarschuwing gegeven.</p>	<p>Als u dit geneesmiddel niet tijdig (binnen 120 uur) na onbeschermd geslachtsgemeenschap gebruikt, dan bestaat het risico op ongewenste zwangerschap en verstoring van de menstruatiecyclus.</p> <p>Niet gebruiken zonder overleg met een arts als u ook andere medicijnen gebruikt.</p>

**Bijlage 5: Bijlage veel verkochte zelfzorgmiddelen met specifieke kenmerken en/of een risicowaarschuwing die de Assistent-drogist en Drogist moet kunnen herkennen en kunnen toepassen:**

Indicatie	Werkzame stof en specifiek kenmerk	Risicowaarschuwingen die de Assistent-Drogist en Drogist moet kunnen herkennen en kunnen toepassen:
Keelpijn	Ambroxolhydrochloride	<p><b>Risicowaarschuwing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar.</li> <li>• Niet gebruiken bij een slechte nier- of leverfunctie zonder overleg met een arts.</li> <li>• Niet gebruiken tijdens zwangerschap of borstvoeding zonder overleg met een arts.</li> <li>• Stop direct met het gebruik bij veranderingen aan de huid of slijmvliezen en neem contact op met een arts.</li> <li>• Niet langer dan 3 dagen achtereen gebruiken.</li> </ul>
Keelpijn (beginnend)	Lidocaïnehydrochloride en propylparahydroxybenzoaat	<p><b>Risicowaarschuwing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 6 jaar.</li> <li>• Bij kinderen jonger dan 12 jaar alleen gebruiken onder toezicht van een volwassene.</li> <li>• Niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding zonder overleg met een arts.</li> <li>• Niet langer dan 7 dagen achtereen gebruiken.</li> <li>• Laat de zuigtablet langzaam in de mond smelten. Niet kauwen of inslikken.</li> <li>• Lidocaïne verdooft, hierdoor kan slikken moeilijker gaan en is de kans op verslikken groter.</li> <li>• Niet direct eten of drinken na het innemen van de zuigtablet. Pas extra op met hete drink- of</li> </ul>

		eetwaren in verband met de kans op verbranden.
Neusverkoudheid	Zoutoplossing (natriumchloride) 0,74 %  <b>Specifiek kenmerk:</b> <b>1<sup>e</sup> keus</b> bij neusverkoudheid bij kinderen tot 2 jaar  Geschikt als overgangsmiddel bij het verslaving aan neusspray met xylometazoline, oxymetazoline of tramazoline	
Productieve hoest	Broomhexinehydrochloride  <b>Specifiek kenmerk:</b> slijmoplossend, niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar	<b>Risicowaarschuwing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar.</li> <li>• Niet gebruiken als u amoxicilline, cefuroxin, doxycycline of erytromycine gebruikt zonder overleg met een arts.</li> <li>• Niet gelijktijdig gebruiken met hoestdempende middelen, zoals codeïne of noscapine.</li> <li>• Niet gebruiken als u een maagzweer heeft of heeft gehad.</li> <li>• Niet gebruiken tijdens de laatste 3 maanden van de zwangerschap.</li> </ul>
Productieve hoest	Acetylcysteïne  <b>Specifiek kenmerk:</b> slijmoplossend, niet geschikt voor kinderen jonger dan 2 jaar.	<b>Risicowaarschuwing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar.</li> <li>• Als u antibiotica gebruikt: deze 2 uur voor of na de acetylcysteïne innemen.</li> <li>• Niet gelijktijdig gebruiken met hoestdempende middelen, zoals codeïne of noscapine.</li> <li>• Niet gebruiken als u een maagzweer heeft of heeft gehad, bij astma of COPD.</li> </ul>
Maagzuur	Calciumcarbonaat en magnesiumcarbonaat	<b>Risicowaarschuwing:</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 12 jaar.</li> </ul>



		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet gebruiken zonder overleg met een arts als u ook andere medicijnen gebruikt.</li> <li>• Niet gebruiken bij een slechte nierfunctie, nierstenen of te laag fosfaatgehalte zonder overleg met een arts.</li> <li>• Niet langdurig gebruiken zonder overleg met een arts.</li> </ul>
Diarree	<p>Loperamide</p> <p><b>Specifiek kenmerk:</b> leeftijd vanaf 8 jaar, niet bij voedselvergiftiging.</p>	<p><b>Risicowaarschuwing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Er is risico op uitdroging. Het is belangrijk om 2 liter water per dag te drinken. Wij adviseren u voor gebruik de bijsluiter te lezen.</li> <li>• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 8 jaar zonder overleg met een arts.</li> <li>• Niet gebruiken bij HIV zonder overleg met een arts.</li> <li>• Niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding zonder overleg met een arts.</li> <li>• Niet gebruiken bij verminderde leverfunctie zonder overleg met een arts.</li> <li>• Stop de behandeling als de ontlasting vaster wordt of als u langer dan 12 uur geen ontlasting heeft gehad.</li> </ul> <p>Gebruik dit medicijn niet langer dan 2 dagen achter elkaar.</p>
Diarree en misselijkheid	<p>ORS, bestaat uit:</p> <p>glucose natriumchloride natriumcitraat kaliumchloride</p> <p><b>Specifieke werking:</b> Tegen uitdroging en ondersteunend middel bij diarree en verstopping</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet gebruiken bij volledige verstopping.</li> <li>• Niet gebruiken bij een slechte nier- of leverfunctie zonder overleg met een arts.</li> <li>• Dit middel bevat suiker: wees voorzichtig als u suikerziekte hebt.</li> <li>• Los het poeder op in precies de hoeveelheid water die genoemd staat op de verpakking.</li> <li>• Gebruik voor de oplossing vers kraanwater (als u in Nederland bent) of mineraalwater zonder prik uit een fles. Als u dat niet heeft</li> </ul>

		<p>kunt u vers gekookt water gebruiken dat u even laat afkoelen.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Het poeder niet mengen met andere vloeistoffen of eten.</li> </ul>
Diarree en vergiftigingen	<p>Actieve kool</p> <p><b>Specifiek kenmerk:</b> enige middel dat gebruikt kan worden bij voedselvergiftiging en bepaalde medicatievergiftigingen</p>	<p><b>Risicowaarschuwing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet gebruiken bij kinderen zonder overleg met een arts.</li> <li>• Niet gebruiken bij volledige verstopping of plotselinge buikpijn.</li> <li>• Niet gebruiken zonder overleg met een arts als u ook andere medicijnen gebruikt.</li> <li>• De werking van de anticonceptiepil kan afnemen. Gebruik aanvullende anticonceptie als u de anticonceptiepil gebruikt.</li> </ul> <p>Uw ontlasting kan zwart verkleuren. Dit is ongevaarlijk.</p>
Aambeien	<p>Hamamelis virginiana, Calendula officinalis, Echinacea pupurea, Aesculuc hippocastanum, Sulfur depuratum, Thiamine (vitamine B1), dl-alfa-tocoferol (vitamine E)</p> <p><b>Specifieke werking:</b> middel tegen gezwollen aderen rond de anus geschikt bij zwangerschap.</p>	
Aambeien	<p>lidocaïne, zinkoxide, bismuthsubnitraat</p> <p><b>Specifieke werking:</b> lokaal verdovend middel bij aambeien met tevens een samentrekkende werking op de bloedvaten van de aambeien.</p>	<p><b>Risicowaarschuwing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet gebruiken bij kinderen zonder overleg met een arts.</li> <li>• Niet gebruiken bij kinderen ouder dan 12 jaar die minder dan 25 kg wegen.</li> <li>• Niet gebruiken bij voortdurend bloedende aambeien.</li> <li>• Niet gebruiken bij ernstige leveraandoeningen, epilepsie, verhoogde schildklierwerking, hartfalen of verzwakte/ernstig zieke mensen zonder overleg met</li> </ul>

		<p>een arts.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding zonder overleg met een arts.</li> <li>• Niet langer dan 2 weken achtereen gebruiken.</li> <li>• Kan vlekken geven in kleding en ondergoed.</li> </ul>
Voetschimmel	<p>Terbinafinehydrochloride 10 mg/g</p> <p><b>Specifieke werking Once-versie:</b></p> <p>Eenmalig aanbrengen op beide voeten.</p> <p><b>1<sup>e</sup> keus</b> bij voetschimmel.</p> <p>Once: Geschikt vanaf 18 jaar. Crème: Geschikt vanaf 12 jaar</p>	
Koortslip	Aciclovir	<p><b>Risicowaarschuwing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 2 jaar zonder overleg met een arts.</li> <li>• Vermijd contact met (de binnenkant van de) mond.</li> <li>• Alleen gebruiken op de huid rond de mond en de lippen.</li> <li>• Smeer de crème niet uit, dit om verspreiding van het virus te voorkomen.</li> </ul>
Wratten	<p>Dimethylether en propaan</p> <p><b>Specifiek kenmerk:</b></p> <p>Vriesmethode</p>	
Insektenbeten of -steken	<p>Tripelenaminehydrochloride</p> <p><b>Specifiek kenmerk:</b></p> <p>Lokaal antihistaminicum bij</p>	<p><b>Risicowaarschuwing:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 4 weken met open wonden of beschadigde huid, zonder overleg met arts.</li> <li>• Alleen gebruiken bij kleine plekjes,</li> </ul>

	insektenbeten- of steken	niet op grote oppervlakten
Hoofdluis	<p>Neem-extract</p> <p><b>Specifieke werking:</b></p> <p>Doodt hoofdluis en neten in 1 behandeling.</p> <p>Werkt verstikkend op hoofdluis en neten.</p> <p>Geschikt vanaf 2 jaar.</p>	
Hoofdluis	<p>Dimeticon</p> <p><b>Specifiek kenmerk:</b></p> <p><b>1<sup>e</sup> keus</b> bij hoofdluis.</p> <p>Werkt verstikkend op hoofdluis en neten.</p> <p>Behandeling duurt 15 minuten.</p> <p>Geschikt vanaf 12 maanden.</p>	
Hoofdluis	<p>Dimeticon en penetrol</p> <p><b>Specifiek kenmerk:</b></p> <p><b>1<sup>e</sup> keus</b> bij hoofdluis.</p> <p>Werkt verstikkend op hoofdluis en neten. Behandeling duurt 15 minuten.</p> <p>Geschikt vanaf 6 maanden.</p>	
Stoppen met roken	<p>Nicotine</p> <p><b>Specifiek kenmerk:</b></p> <p><b>1<sup>e</sup> keus</b> bij stoppen met roken</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Niet gebruiken bij kinderen jonger dan 18 jaar.</li> <li>• Niet gebruiken zonder overleg met een arts als u ook andere medicijnen gebruikt of een andere aandoening heeft.</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"><li>• Zonder overleg met een arts niet gebruiken bij zwangerschap of borstvoeding.</li><li>• Niet gebruiken bij een slecht nier- of leverfunctie.</li><li>• Maximaal 6 maanden gebruiken zonder overleg met arts.</li><li>• Buiten bereik van kinderen bewaren.</li></ul>
--	--	---